

I Bei Trins im Gschnitztale (Kern. 78^a Nr. 35651, 78^b IX. p. 136 als *O. leporina*), daselbst im Kalkgebiete auf steinigem Waldboden bei 13—1600 m häufig; so im Bannwalde und am Padasterbache (Sarnth.), im ärarischen Walde am Trunabache (Sarnth. 8 p. 412), im Martartale (Sarnth.), bei Gschnitz (Stolz!); am Fusse des Tribulaun gegen die Obernberger Seen 1800 m (Bornm.!); Griesberg am Brenner, Kalk 1600 m (Sarnth.).

U Oberautal bei Achenkirchen (Hieronymus!).

P Schluderbach (Arn. b. Rehm 8 p. 1027; 5 Nr. 652!).

D Auf Waldboden im Gschlöß (Höhnel); beim Wildbade Innichen (W. Magn.!).

N Val di Sole, in Nadelholzwäldern auf Kalkboden, truppweise, besonders an Quellen (Bres. 1 I. p. 68; b. Roumeguère 1 Nr. 4162 als *P. (Aleuria) auriculata*; b. Rehm 8 p. 1027).

G Tione, am Wege zum Duronepaß zwischen Hynnum commutatum an quelligen Orten, Kalk (Sarnth. Hb. F.!).

In Grevillea XXII. (1893) p. 66 — nicht p. 107, wie Rehm l. c. p. 1270 citiert — behauptet Masee, daß *Otidea auricula* Rehm in Ascom. exs. Nr. 652 [1882], in *Hedwigia* l. c. und bei Bres. l. c. nicht der *Elvella auricula* Schaeff. entspreche, welche gleich *Peziza (Cochleatae) auricula* Cooke, Mycogr. (1879) fig. 213 = *Otidea auricula* Masee in Grevillea XXII. (1893) p. 65 (non Bres.) sei. Cooke bezeichnet dagegen den von Rehm und Bresadola locis cit. behandelten Pilz als *O. neglecta* Masee. Rehm l. c. p. 1270 läßt die Sache dahingestellt sein, ohne ein endgiltiges Urteil abzugeben. Die zwei Arten, für welche Masee dieselbe Verbreitung angibt, stehen sich jedenfalls sehr nahe. Sie sollen sich nach Rehm höchstens durch die Gestalt der Zellen des parenchymatischen Gehäuses des Apotheciums unterscheiden.

338. *Sphaerospora* Sacc.

1. (2286.) *S. trechispora* (Berk. et Br.) Sacc., *Peziza trechispora* Berk. et Br. — Rbh. III. (Rehm) p. 1038 Nr. 5718.

V Allenthalben am Erdboden, bei Feldkirch (Rick 1 p. 62).

339. *Pseudoplectania* Fuckel.

1. (2287.) *P. nigrella* (Pers.) Fuckel, *Peziza nigrella* Pers. — Rbh. III. (Rehm) p. 1039 Nr. 5720.

V Unter Tannen im Göfiser Walde bei Feldkirch (Rick 3 p. 395).

2. (2288.) *P. melaena* (Fr.) Sacc., *Peziza melaena* Fr., *P. sphagnophila* Pers. — Rbh. III. (Rehm) p. 1040 Nr. 5721.

V An einem faulenden Tannenstamme im Göfiser Walde bei Feldkirch (Rick 1 p. 62).

K In Nadelwäldern auf überdecktem faulenden Holze im Frühjahr (Ung. 8 p. 234); am Großen Rettenstein bei 1950 m (Saut. 18 p. 306 als *Peziza melaena* γ *sphagnophila*).

340. *Lachnea* Fr.

1. (2289.) *L. ampezzana* Rehm (1895). — Rbh. III. (Rehm) p. 1043 Nr. 5725.

P An einer Straßenböschung im Ampezzotale (Arn. b. Rehm 8 p. 1044).