

8. (2436.) *C. capitata* (Holmsk.) Link, *Clavaria capitata* Holmsk. — Rbh. II. (Wint.) p. 151 Nr. 2950.

V Auf *Elaphomyces cervinus* zerstreut in den meisten Wäldern um Feldkirch (Rick 1 p. 60; 4 p. 326).

T Auf *E. variegatus* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 353).

71. Fam. Sordariaceae.

377. *Sordaria* Ces. et De Not.

1. (2437.) *S. discospora* (Auersw.) Nießl, *Hypocpra discospora* Auersw. — Rbh. II. (Wint.) p. 167 Nr. 2979.

O Auf Kuhmist bei Tumpen im Oetztale (Höhnel).

378. *Podospora* Ces.

1. (2438.) *P. coprophila* (Fr.) Wint., *Sphaeria coprophila* Fr. — Rbh. II. (Wint.) p. 172 Nr. 2986.

V Auf Kuhmist bei Feldkirch, häufig (Rick 1 p. 60).

T Auf Ziegenkot bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 314).

2. (2439.) *P. lignicola* (Fuckel) Wint., *Sordaria lignicola* Fuckel. — Rbh. II. (Wint.) p. 172 Nr. 2987.

V Auf *Cerasus*-Holz im Saminatale bei Feldkirch (Rick 5 p. 160).

3. (2440.) *P. decipiens* Wint. (1888), *Sordaria decipiens* Wint. (1873). — Rbh. II. (Wint.) p. 173 Nr. 2988.

Auf Mist, in Tirol (Sacc. 9 I. p. 235).

379. *Hypocpra* Fr.

1. (2441.) *H. fimeti* (Pers.) Fr., *Sphaeria fimeti* Pers., *Copro-lepa fimeti* Sacc. — Rbh. II. (Wint.) p. 177 Nr. 2997.

Auf Kuh- und Pferdemit in Südtirol (Sacc. 9 I. p. 248; Wint. 3 II. p. 178).

380. *Sporormia* De Not.

1. (2442.) *S. minima* Auersw. — Rbh. II. (Wint.) p. 181 Nr. 3006.

Auf dem Kote von Pflanzenfressern.

O Bei Kūhetai (Rehm!).

T Auf Ziegenkot bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 332).

2. (2443.) *S. intermedia* Auersw. — Rbh. II. (Wint.) p. 182 Nr. 3010.

O Auf Kuhmist im Pitztale (Rehm!); bei Kūhetai (Rehm 5 Nr. 134).

3. (2444.) *S. octomera* Auersw. — Rbh. II. (Wint.) p. 185 Nr. 3017.

T Auf Ziegenkot bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 332).