

15. (2803.) *V. ambiens* (Pers.) Fr., *Sphaeria ambiens* Pers.; Spermogonienform: *Cytospora ambiens* Sacc. — Rbh. II. (Wint.) p. 729 Nr. 4148, VI. (All.) p. 567 Nr. 1638.

I Auf dürren Zweigen von *Prunus spinosa* am „sticklen Steig“ am Paschberg bei Innsbruck (Prantner Hb. F.).

N Auf abgestorbenen Aesten von *Castanea sativa* und *Quercus* sp. im Val di Sole (Berl. & Bres. 1 p. 308). Vergl. auch *Cytospora carphosperma* Fr., die nach Berl. & Bres. l. c. dazu gehört.

T An Eichenzweigen (?) und Aesten von *Populus nigra* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 362).

16. (2804.) *V. conoidea* Rehm. — Rbh. II. (Wint.) p. 732 Nr. 4151.

Auf dürren *Berberis*-Aesten.

O Im Oetztale (Rehm 7 p. 118).

I Bei Gries in Sellrain und bei Bärenbad in Stubai (Rehm 7 p. 118).

17. (2805.) *V. Persoonii* Nitschke; Spermogonienform: *Sphaeria leucostoma* Pers., *Cytospora leucostoma* Sacc. in *Michelia* II. p. 264 (1881). — Rbh. II. (Wint.) p. 733 Nr. 4153.

Auf abgestorbenen Aesten und Stämmen von *Prunus cerasus*, *P. padus* und *Sorbus aucuparia*.

O Auf *Sorbus*-Zweigen bei Tumpen, die Spermogonienform (Höhnel).

U An *Prunus padus* bei Erl (Schnabl).

K An Weidenzweigen gemein (Ung. 8 p. 233).

T An abgestorbenen Aesten von *Prunus cerasus* bei Trient, die Spermogonienform (Berl. & Bres. 1 p. 363).

18. (2806.) *V. nivea* (Hoffm.) Fr., *Sphaeria nivea* Hoffm., *Veget. Cryptog.* (1787) p. 28 tab. 6; Spermogonienform: *Cytospora nivea* Sacc. — Rbh. II. (Wint.) p. 734 Nr. 4154; VI. (All.) p. 590 Nr. 1710.

D Auf abgestorbenen Pappelzweigen bei Innichen, die Spermogonienform (W. Magn.!).

B Auf *Populus tremula* im Tiersertale (Höhnel).

T An stärkeren Aesten von *Populus nigra* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 308).

19. (2807.) *V. Auerswaldii* Nitschke. — Rbh. II. (Wint.) p. 735 Nr. 4155.

K Auf *Betula „alba“* bei Hochfilzen (Höhnel).

20. (2808.) *V. diatrypa* (Fr.) Nitschke, *Sphaeria diatrypa* Fr.; Spermogonienform: *Cytospora diatrypa* Sacc., *Syll. fung.* III. (1885) p. 226. — Rbh. II. (Wint.) p. 736 Nr. 4156.

O Auf *Alnus viridis* bei Huben im Oetztale (Rehm 5 Nr. 174^b!; b. Thümen 4 Nr. 363).

I Auf *A. viridis* bei Praxmar in Sellrain (Rehm 5 Nr. 174[!]).

T Auf toter Rinde von *A. glutinosa* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 362).

Var. *Hippophaës* Rehm in *Hedwigia* XXI. (1882) p. 48.

I Auf abgestorbenen Zweigen von *Hippophaë rhamnoides* am Inn zwischen Zirl und Innsbruck (Rehm 5 Nr. 279[!], in *Hedwigia* l. c.).