

Auf *G. tetrahit*.

- I** Beim Lanser See (Stolz b. Magn. 16 p. 113!).
K Bei Kitzbühel (Ung. 8 p. 230 als *E. communis* r. *Labiatarum* Wallr.).
M Bei Trafoi (Magn. !; Jaap 1 p. 136).
B Bei Ratzes (Jaap 1 p. 136).

Auf *Glechoma hederacea*.

- I** Bei Trins (Magn.!).

Auf *Lamium album*.

- I** Am Volderberg bei Hall (Stolz b. Magn. 16 p. 113!); bei Gschnitz (Magn. *ibid.*!).

- P** In Sand bei Taufers (Magn. 16 p. 113!).

- B** Bei Klausen (Magn. !); „vor St. Ulrich St. Christina in Gröden“ (Stolz b. Magn. 16 p. 113!).

- F** Bei San Martino di Castrozza (Magn.!).

Auf *L. amplexicaule*.

- B** Bei Girlan (Hfl. b. Magn. 16 p. 113).

Auf *L. luteum* (*Galeobdolon luteum*).

- I** Das Oidium beim Peterbrünnl (Stolz b. Magn. 16 p. 113!).

Auf *L. maculatum*.

- I** Bei Hall (Peyr. b. Magn. 12 p. 66!).

Auf *L. purpureum*.

- I** Innsbruck: beim Peterbrünnl (Peyr. b. Magn. 12 p. 66!).

Auf *Salvia glutinosa*.

- I** Das Oidium um Kerschbuchhof bei Hötting (Stolz b. Magn. 16 p. 113!) und am Wege nach Hall (Peyr. b. Magn. 12 p. 66!); bei Neustift (Sarnth.).

- M** Bei Trafoi (Magn.!).

- B** Bei Bozen (Mohl 1 Sp. 142).

Auf *S. verticillata*.

- L** Das Oidium in Höfen bei Reutte (Sarnth.!).

8. (2921.) **E. Cichoriacearum** DC. (1805), Erysiphe Cichoriacearum Schroet. in Cohn, Krypt.-Fl. Schles. III. 2. p. 238 (1893), Alphitomorpha horridula Wallr., Erysiphe horridula Lév. in Ann. sc. nat. Bot. 3. sér. XV. (1851) p. 170, Alphitomorpha lamprocarpa Wallr., Fl. crypt. germ. II. (1833) p. 757, Erysiphe lamprocarpa Lév. p. p. — Rbh. II. (Wint.) p. 33 Nr. 2724.

Auf *Arctium majus* (*Lappa major*).

- O** Bei Brennbüchel (Magn. 16 p. 113!).

- I** Am Sillfalle bei Wilten (Peyr. b. Magn. 12 p. 66!), bei Igls (Stolz b. Magn. 16 p. 113!).

Auf *A. minus* (*Lappa minor*).

- T** Bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 304).

Auf *Carduus viridis*.

- I** Auf der Höttinger Alpe (Stolz b. Magn. 16 p. 113!).

Auf *Cirsium oleraceum*.

- I** Bei Lans (Magn. 16 p. 113!), bei Aldrans (Stolz *ibid.*!).