

583. *Leptostroma* Fr.

1. (3223.) ? *L. filicinum* Fr. — Rbh. VII. (All.) p. 358 Nr. 3841.  
**K** An *Pteridium aquilinum* im Bichlach bei Kitzbühel (Ung. 8 p. 231).  
 Diese Angabe ist insoferne zweifelhaft, als Unger l. c. auch das nach Allescher l. c. p. 360 davon spezifisch verschiedene *L. Pteridis* Ehrenberg als Synonym beifügt.

2. (3224.) *L. punctiforme* Wallr. — Rbh. VII. (All.) p. 358 Nr. 3842.

**K** Auf Blättern von *Salix „repens, philicifolia* u. s. w.“ (Ung. 8 p. 231).

— *L. vulgare* Fr., siehe *Hypoderma commune* (Fr.) Duby p. 329.

3. (3225.) *L. Spiraeae* Fr. — Rbh. VII. (All.) p. 356 Nr. 3835.  
**I** Auf abgestorbenen Stengeln von *Aruncus silvester* im Volderwald bei Hall (Stolz!).

4. (3226.) *L. areolatum* (Fr.) Wallr., *Sclerotium areolatum* Fr. — Rbh. VII. (All.) p. 360 Nr. 3849.

**K** Auf welken Blättern von *Prunus padus* gemein (Ung. 8 p. 231).

Unger citiert allerdings l. c. als Synonym zu *Leptostroma areolatum* Wallr. das von E. Fries in *Syst. mycol.* II. (1823) p. 263 beschriebene *Sclerotium areolatum* Fr., wie das auch Allescher l. c. tut. Aber Fries selbst hat später in *Summa veget. Scand.* (1849) die Art als *Melampsora areolata* Fr. bezeichnet, die ich *Thecopsora areolata* (Fr.) Magn. (vergl. *Oesterr. bot. Zeitg.* LII. (1902) p. 491) nenne. Auch die kurze Beschreibung von Fries in *Syst. mycol.* II. p. 263 „confluens planiusculum, opacum, nigro-fuscum, eleganter angulato-areolatum“ paßt sehr gut zu den Teleutosporenlagern der *Thecopsora areolata* und dürfte kaum zu einer *Leptostroma* passen. Ich glaube auch, daß Ungers Angabe des *Leptostroma* die Teleutosporenlager der *Thecopsora areolata* auf *Prunus padus* zu Grunde liegen, um so mehr, da er diese in Tirol verbreitete Art sonst nicht angibt. — Vergl. oben p. 118.

584. *Labrella* Fr.

1. (3227.) *L. punctum* Corda. — Rbh. VII. (All.) p. 365 Nr. 3863.  
**I** Auf *Chaerophyllum cicutaria* (*Ch. hirsutum*) auf den Pflutschwiesen bei Steinach 1350 m (Sarnth!).

585. *Melasmia* Lév.

— *M. alnea* Lév., siehe *Gnomoniella tubaeformis* (Tode) Sacc. p. 489.

1. (3228.) *M. Berberidis* Thüm. et Wint. — Rbh. VII. (All.) p. 372 Nr. 3881.

**I** An lebenden Blättern von *Berberis vulgaris* bei Trins nächst dem Ansitze Schneeberg und gegen Finetz 12—1250 m (Sarnth!).

586. *Discosia* Lib.

1. (3229.) *D. strobilina* Lib. — Rbh. VII. (All.) p. 378 Nr. 3891.  
**T** An Fichtenzapfen bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 374).