

2. (3477.) *D. Celtidis* Roumeguère. — Rbh. VII. (All.) p. 113 Nr. 3179.

T An berindeten Aesten von *Celtis australis* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 366).

3. (3478.) *D. sycina* Montagne et Castagne. — Rbh. VII. (All.) p. 123 Nr. 3211.

T An berindeten Aesten von *Ficus carica* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 365).

— *D. Visci* Fr., siehe *Gibberidea Visci* Fuckel p. 447.

4. (3479.) *D. Crataegi* Westend. — Rbh. VII. (All.) p. 118 Nr. 3194.

K An trockenen Aesten von *Crataegus oxyacantha* bei Kössen (Schnabl).

5. (3480.) *D. Rubi* Fr. — Rbh. VII. (All.) p. 157 Nr. 3316.

T An abgestorbenen Schößlingen von *Rubus „fruticosus“* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 367).

— *D. Pruni* Fuckel, siehe *Othia Pruni* Fuckel p. 447.

6. (3481.) *D. Siliquastri* Westend. — Rbh. VII. (All.) p. 114 Nr. 3181.

T An abgestorbenen Aesten von *Cercis siliquastrum* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 367).

7. (3482.) *D. rudis* Desm. — Rbh. VII. (All.) p. 119 Nr. 3197.

T An abgestorbenen Aesten von *Laburnum alpinum* (*Cytisus alpinus*) bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 366).

— *D. Gleditschiae* Pass., siehe *Cucurbitaria Gleditschiae* Ces. & De Not. p. 448.

8. (3483.) *D. profusa* De Not. — Rbh. VII. (All.) p. 155 Nr. 3311.

T An abgestorbenen Aesten von *Robinia pseudacacia* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 366).

— *D. Robiniae* Westend., siehe *Cucurbitaria elongata* (Fr.) Grev. p. 448.

9. (3484.) *D. Emeri* Sacc., Syll. fung. X. (1892) p. 276, *D. Coronillae* Berl. et Bres. (1889) non Brunaud in Revue mycol. IX. (1887) p. 14. — Rbh. VII. (All.) p. 117 Nr. 3190.

Wahrscheinlich eine Pyknidenform von *Cucurbitaria Coronillae* (Fr.) Sacc.

T An abgestorbenen Stengeln von *Coronilla emerus* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 365).

10. (3485.) *D. Sophorae* Spegazz. et Sacc. — Rbh. VII. (All.) p. 162 Nr. 3333.

T An dünnen Aesten von *Sophora japonica* bei Trient (Berl. & Bres. 1 p. 365).