

633. *Sclerotium* Tode.

- *S. semen* Tode, siehe *Typhula variabilis* Riess p. 142.
 — *S. clavus* DC., siehe *Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. p. 434.

1. (3523.) *S. Rhinanthi* Magn. in Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXV. (1894) p. XXIII—XXV. — Rbh. III. (Rehm) p. 1254 ad Nr. 4677. **I** Auf *Alectorolophus angustifolius* am Eingange in das Martartal bei Gschnitz (Wettst.).

Gehört nach Rehm l. c. vielleicht zu *Scleroderris aggregata* (Lasch) Rehm, welche typisch auf *Euphrasia* auftritt. Ein der letzteren Art sehr ähnlicher, nur durch die Größe der Ascosporen sich etwas unterscheidender Pilz tritt auf *Alectorolophus* auf und wird von Saccardo, Syll. fung. VIII. (1889) p. 585 als eigene Art, *Ephelina Rhinanthi* beschrieben. Er könnte die Perithezienform des *Sclerotium* sein.

2. (3524.) *S. durum* Pers., Syn. (1801) p. 121, Fr., Syst. mycol. II. (1823) p. 259.

I Auf dürrer Umbelliferenstengeln in der Sillschlucht bei Innsbruck (Sarnth., det. Bres.).

M Auf *Chaerophyllum*? sp. — jedenfalls auf einer Umbellifere, an der Stilsferjochstraße (Höhnel).

Var. *fuscum* Fr. l. c.

K Auf Blättern und Stengeln von *Epilobium angustifolium* bei Kitzbühel (Ung. 8 p. 230).

3. (3525.) *S. sanguineum* Fr., Syst. mycol. II. (1823) p. 255.

K An Blättern von *Majanthemum bifolium* nicht selten (Ung. 8 p. 230).

4. (3526.) *S. niveum* Saut. in Flora XXIV. (1841) p. 320.

K Auf *Veratrum album* auf dem Kleinen Rettenstein (Saut. 18 p. 320; Ung. 8 p. 305).

5. (3527.) *S. quercinum* Pers., Syn. (1801) p. 124 non Fl. dan. tab. 1380. Fr., Syst. mycol. II. (1823) p. 260 als Synonym von *S. Pustolla* Fr., vergl. auch *ibid.* p. 577.

B Auf abgefallenen Eichenblättern in Haslach bei Bozen (Krav. 1 p. 14).

6. (3528.) *S. rhizodes* Auersw. in Klotzsch, Herb. mycol. Nr. 1232 (1849). bot. Zeitg. VII. (1849) Sp. 294, b. Fuckel in Nassau. Ver. Naturk. XXVII.—XXVIII. (1874) p. 84.

O Auf *Calamagrostis* sp. bei St. Anton am Arlberg (Frank 3 p. 139).