

p. 318 A. Hochstetteri f. obtectum Arn., Predazzo; Arn. Exs. Nr. 1011; Verrucaria marmorea Scop., Slavini di San Marco: Arn. Exs. Nr. 1592.

Verfasser erwähnt (p. 161 u. 316), dass er in zahlreichen Fällen das Untersuchungsmaterial an denselben Fundorten sammeln konnte, von welchen es Arnold für seine Exsiccaten entnommen hatte. p. 318 wird eine solche Oertlichkeit genannt: Südseite des Latemargebirges oberhalb Predazzo.

Gemböck Robert (p. 86), gest. zu Wilten am 9. März 1901.

12. Eine Herbsttour auf den Birchkogl (2831 m) bei Kühtai. — Innsbrucker Nachrichten 1900 Nr. 235 p. 5—6 (Pseudonym unterfertigt mit „Robertus“).

Erwähnt *Solorina crocea*, *Stereocaulon »alpestre«* [alpinum!] von dort.

Hedlund J. T., Docent der Botanik an der Universität und Amanuensis am botanischen Garten in Upsala.

1. Kritische Bemerkungen über einige Arten der Flechtengattungen *Lecanora* (Ach.), *Lecidea* (Ach.) und *Micarea* (Fr.). — Bihang Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Band 18, Afd. III, Nr. 3, 1892. 8°. 103 p. 1 Taf.

p. 94 »*Micarea incrassata* n. sp. supra museos circa Brenner. Tirol (A. Minks. M. B. U.)«

Hepp Ph. (p. 110).

2. Ueber die Gattung *Guepinia*. — Verh. schweiz. naturforsch. Ges. Zürich 1864 p. 85—87.

Begründet die genannte Gattung nach Exemplaren von *G. polyspora*, gesammelt von Milde an Gneissfelsen bei Meran im November 1863, ausgegeben in Flecht. Europas Bd. XVIII.

Hesse O., Fabriksbesitzer in Feuerbach bei Stuttgart.

1. Beitrag zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Bestandtheile. — Journ. f. prakt. Chemie. Neue Folge. Bd. 57, 1898 p. 232—318 (I.), 409—447 (II.); Bd. 58, 1898 p. 465—561 (III).

Enthält Angaben über 16 Flechtenarten, vom Verfasser bei Brand nächst Bludenz, darunter eine auch von seinem Sohne im Achenthale gesammelt.

Hoffmann G. Fr. (p. 120).

- $\frac{1}{2}$. *Plantae lichenosae. Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnæi, quæ Lichenes dicuntur.* 3 Vol. Lipsiæ 1789—1801. Fol. I. 1790. IV. 104 p. tab. col. I—XXIV.; II. 1794. 78 p. tab. col. XXV.—XLVIII.; III. 1801. 62 p. tab. col. XLIX.—LXXII.

III. p. 1 wird das Vorkommen von *Usnea flaccida* = *Evernia divaricata* in Tirol erwähnt.

Jatta Antonio in Ruvo di Puglia, Campagna.

1. *Sylloge Lichenum italicorum.* Trani, V. Vecchi. 1900. 8°. XXXIX, 623 p. — Ref.: *Hedwigia* Bd. XXXIX. 1900 p. (92) (von G. Lindau).

Enthält an 28 Stellen Angaben aus der Gegend von Trient nach Mittheilungen G. Bresadola's, dann Mehreres vom Monte Baldo, meist nach der Litteratur.

Kerner A. v. (p. 149).

- 78^a. *Flora exsiccata austro-hungarica a museo botanico universitatis vindobonensis edita.* Fasc. XV. (Cent. XXIX., XXX.) Nr. 2801