

**I** Innsbruck: Igls an Eschen, Iglerwald „ad arbores et frutices“ (Pkt. Hb. F.; b. DT. 10 p. 261 irrthümlich sub var. fastigiata).

**K** Selten um Kitzbühel (Ung. 8 p. 256).

**B** Jenesien: an Buchen im Paterwalde und auf dem Remp (Kst. 4 III. p. 726), auf *Acer pseudoplatanus* in der Nähe des Steiflerhofes c. ap. (Kst. 4 V. p. 3); Ritten: an Buchen bei Wolfsgruben und an Espen bei Kematen (Hsm. Hb. F.).

**T** Lavarone: an Buchen, fr. (Kst. 4 VI. p. 215).

**R** Folgaria: San Sebastiano an Buchen, fr. (Kst. 4 VI. p. 215); Monte Baldo (Turra 1 p. 152): an Buchen (Hb. Hb. F., siehe Pkt. 9 p. 54, bei DT. 10 p. 261 irrthümlich sub var. fastigiata), Malga Tolge an Buchen (Sarnth.).

5. (22.) **R. populina** (Ehrh.) Wainio in Meddel. soc. fauna et fl. fenn. XIV. (1888) p. 21, *Lichen populinus* Ehrh., Pl. crypt. exs. Nr. 276 (1793), *Lichen fastigiatus* Pers. in Usteri, Ann. VII. (1794) p. 156, *Ramalina fastigiata* Ach., Lich. univ. (1810) p. 603, *R. calicaris*  $\beta$  fastigiata Th. Fr., Lich. scand. p. 34 (1871), *R. fraxinea* var. fastigiata Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 113 und XLVII. (1897) p. 354. Siehe auch Th. Fr. l. c. p. 35 und Arn. in Flora LXIII. (1880) p. 568. — Stizenb. l. c. p. 96 Nr. 7; Arn. Nr. 15.

**U** Am Vorderen Sonnwendjoch bei 1620 m an den stärkeren Zweigen von *Acer pseudoplatanus* (Arn. 4 XII. p. 524).

? **R** Monte Baldo (Hartmann b. DT. 10 p. 261): Vall' Artilone (Poll. 1 p. 112; siehe auch 3 III. p. 491).

6. (23.) **R. strepsilis** (Ach.) Zahlbr. in Ann. naturhist. Hofmus. Wien IX. (1894) p. 130, *Parmelia strepsilis* Ach., Meth. (1803) p. 266, *Ramalina polymorpha* var. *strepsilis* Ach., Syn. (1814) p. 295, *R. polymorpha* var. *capitata* Ach., Lich. univ. (1810) p. 601, *R. capitata* Nyl. in Flora LV. (1872) p. 246, ?*Lichen tinctorius* Web., Spicil. (1778) p. 241; siehe Stizenb. l. c. p. 99. — Stizenb. l. c. p. 98 Nr. 10; Arn. Nr. 17.

**O** Stanzerthal: Hochkor ober der Waldzone längs der obersten Kante eines grösseren Felsblockes verbreitet (Arn. 4 XXV. p. 379); Kühetai: auf sonnigen, freistehenden Felsen zwischen den Finsterthaler Seen nicht häufig und nur steril (Arn. 4 XIV. p. 437); Vent: auf Glimmerschiefer im Niederthale (Hfl. Hb. F. mit *Gyrophora cylindrica* f. *torinata*); Gurgl: steril nicht häufig auf einem freistehenden Glimmerschiefer-Felsen am Fusse des Hangerer (Arn. 4 XV. p. 355).

**I** Rosskogel: nicht häufig an Felsen beim Weissbache (Arn. 4 III. p. 951, XVII. p. 549); Innsbruck: Iglerwald auf Thonschiefer (Pkt. Hb. F. als *R. pollinaria*; siehe Pkt. 9 p. 54; b. DT. 10 p. 261).

**B** Sarnthal: östliche Kaserböden auf Porphyry (Kst. 4 VI. p. 193 als *R. polymorpha*); Rittnerhorn 3. Sept. 1840 (F. Giovanelli Hb. F.); ?Bozen: (Kst. 1 p. 28 als *R. polymorpha*, später jedoch nicht mehr).

**F** Predazzo: an sonnig gelegenen Porphyrfelsen ober dem Colbriccone-See (Arn. 4 XXI. p. 101).

7. (24.) **R. pollinaria** (Westr.) Ach., Lich. univ. (1810) p. 608, *Lichen pollinarius* Westr. in Svensk. Vetensk.-Akad. Handl. XVI. (1794) p. 56, Ach. ibid. XVIII. (1796) p. 263. — Stizenb. l. c. p. 100 Nr. 11; Arn. Nr. 18.