

D Tauern: Kiesfläche vor dem Schlatenkees, Rottenkogel, nur steril (Arn. 4 XVIII. p. 263, 255).

N Siehe *Cl. crispata*.

B Rittnerhorn, Ritten (Hsm. Hb. F.); Seis (Hsm. Hb. F., det. Poetsch; Pfaff), auf Waldboden bei Ratzes, Augitporphyr (Arn. 4 IV. p. 608); Bozen: auf steinigere Erde zwischen Felsen, Sigmundskron etc. (Kst. 2 p. 9), Haslach (Hsm. Hb. F.), Kühbach; Eggenthal: Karrerwald (Pfaff); Montan bei Neumarkt auf Porphyrrerde (Kst. 4 VI. p. 212).

G Pinzolo: Corno alto zwischen Moosen (Kst. 4 I. p. 337).

T Trient: Terlagio-See auf Erde (Kst. 4 V. p. 328), Oltrecastello (Per.).

R Riva: Ponale, auf Erde, nicht häufig, substeril (Arn. 4 IX. p. 309); Rovereto (Crist.); am tirolischen Theile des Monte Baldo (Poll. 1 p. 109, 113; 3 III. p. 481).

b) racemosa (Hoffm.), *Cl. racemosa* Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 144, *Cenomyce racemosa* Ach., Syn. (1814) p. 275, *Cl. furcata* γ *racemosa* Floerke, Comm. Clad. (1828) p. 152, *Cl. furcata* α *racemosa* Wainio in Acta soc. fauna et fl. fenn. IV. (1887) p. 323, *Cenomyce furcata* β *stricta* Ach., Lich. univ. (1810) p. 561, *C. allotropa* var. *corymbosa* Ach., Lich. univ. (1810) p. 556, *Cl. furcata* *b. cristata* Fr., Lich. eur. (1831) p. 229. — Wainio l. c. I. p. 323.

O Arlberg: auf steinigem Boden zwischen Alpenrosen, Rendelthal (Arn. 4 XXV. p. 378, 379, *b. Rehm* 4 Nr. 415, 416), oberes Malfontal (Arn. 4 XXV. p. 374, 375, *b. Rehm* 4 Nr. 414: pl. alpina); Umhausen: nicht selten auf den Gneissblöcken am Wasserfalle (Arn. 4 VII. p. 281 als *C. furcata racemosa* f. *squamulosa*, aber bei Arn. 4 XXI. p. 115 hierher gezogen); Gurgl: steril auf steinigem Boden innerhalb der Rhododendronzone (Arn. 4 XV. p. 370).

I Rosskogel: auf Erdboden, steril nicht selten (Arn. 4 XVII. p. 558); Innsbruck: Iglerswald zwischen Moosen mit f. *polyphylla* (Pkt. Hb. F.); Volderbad (Strasser).

K Im Thale gemein: *c. racemosa* Fr.; „*b. cristata* Fr. steigt in der Centalkette am höchsten“ (Ung. 8 p. 247, 246).

P Ehrenburg: stellenweise f. *corymbosa* Ach., häufig f. *racemosa* Hoffm. (Kst. 4 VII. p. 289).

D Lienz: Feldwaibelalpe auf steinigem Boden: *C. furcata* f. *corymbosa* Ach. (Arn. 4 XVIII. p. 249).

B Sarnthal: nördliches Kreuzjoch (Kst. 4 VI. p. 204); Jenesien: Krummenbühel auf Porphyrrerboden: f. *racemosa*, f. *stricta* Ach., f. *corymbosa* (Kst. 4 III. p. 717, V. p. 339), Remp auf Erde und Holz (Kst. 4 III. p. 717, 719, VI. p. 220); Gröden: auf Porphyr bei Immerpontifes (Arn. 4 XXVIII. p. 120); Schlern: auf Waldboden ober Hauenstein (Arn. 4 IV. p. 632); Bozen: auf Erde zwischen Moosen, Virgl. Kühbach (Kst. 2 p. 9); Eislöcher hie und da auf Erde zwischen den Porphyrböcken mit *C. squamosa* (Arn. 4 VIII. p. 293), aufermoosten Blöcken (Arn. 4 X. p. 113 als f. *squamulosa* und XXI. p. 115); Eggenthal: Karrersee zwischen Moosen mit f. *esquamulosa*, alba [siehe Wainio l. c. I. p. 331] (Kst. 4 II. p. 340).

F Paneveggio: über Baumstrünken, auf einem morschen Stamme im Walde gegen Rolle eine kleinere, l. c. beschriebene Form (Arn. 4 XXIII. p. 141, *b. Rehm* 4 Nr. 250).