

**P** Ehrenburg: auf dem Kienberge seltener (Simmer b. Kst. 4 VII. p. 289); Taufers: auf bemoosten Granitblöcken am Waldwege nach Rain c. ap., nicht häufig (Arn. 4 XIX. p. 274); Ampezzo: Schluderbach, von der Erde auf morsche Zirbenstrünke und deren Hirnschnitt übergehend (Arn. 4 XVI. p. 412, XXI. p. 99, Arn. Exs. Nr. 695<sup>a, b, c</sup>, b. Rehm 4 Nr. 86, 89 nach Arn. 4 XXI. p. 115, 87 und Arn. in Ber. bayer. bot. Ges. IV. (1896) Rehm Clad. exs. Exs. p. 4).

**N** Höhe des Mendelgebirges (Hfl. Hb. F. als *Cenomyce racemosa*, det. Arn. 1901; von DT. 10 p. 277 zu *Cl. furcata* gebracht).

**B** Bozen: auf Erde: Campenn, Virgl (Kst. 2 p. 9).

**F** Predazzo: Erdboden auf der Höhe des Mulatto, Melaphyr 2150 m (Arn. 4 XXIII. p. 95); Paneveggio: nicht gar selten auf faulen Fichtenstrünken, c. ap. (Arn. 4 XXI. p. 111, XXIII. p. 141, Exs. Nr. 695<sup>d</sup>), auf Porphyr-Waldboden gegen den Colbriccon (Arn. 4 XXXIII. p. 106, b. Rehm 4 Nr. 294, 295), auf Erde eines Porphyrblockes ober Rolle gegen den Cavallazzo: *phyllocephala* Schaer., Enum. (1850) p. 185 (Arn. 4 XXIV. p. 264, XXX. p. 356, Rehm 4 Nr. 354), auf Porphyrerdboden im Walde gegenüber Paneveggio (Arn. b. Rehm 4 Nr. 296; Arn. in Ber. bayer. bot. Ges. IV. (1896) Rehm Clad. exs. p. 7; siehe Arn. 4 XXII. p. 106).

**G** Pinzolo im Mandrongebiete und bei S. Stefano auf Erdboden zwischen Moosen (Kst. 4 I. p. 337, 325).

**T** In Wäldern bei Trient (Jatta 1 p. 94).

b) *divulsa* (Delise) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 115, *Cenomyce divulsa* Delise in Duby, Bot. gall. II. (1830) p. 625, *Cl. crispata*  $\gamma$  *divulsa* Wainio in Acta soc. fauna et fl. fenn. IV. (1887) p. 385. — Wainio l. c. I. p. 385. Siehe auch f. *dilacerata* und *elegans*.

**O** Mittelberg: im Taschachthale nicht selten (siehe d. Spec.); Kähetai: auf felsigem Glimmerschieferboden am Eingange in das Längenthal: Rehm 4 Nr. 256, ebendort f. *procera* Arn., in Rehm Clad. exs. Nr. 257 (1885) (Arn. 4 XXII. p. 80, b. Rehm l. c., siehe Wainio l. I. p. 387).

**I** Rosskogl: auf felsigem Boden des Glimmerschiefergerölles ober dem Weissbache (Arn. 4 XXI. p. 95, b. Rehm 4 Nr. 128), Innsbruck: Felsen am Aufstiege zur Neunerspitze (Pkt. Hb. F.).

**P** Ampezzo: auf Erde des Wiesenplanes bei Schluderbach am Wege zum Val Fonda c. ap. (Arn. 4 XVI. p. 401, b. Rehm 4 Nr. 86, 89), ebendort mit der Hauptform auf morsche Zirbenstrünke und deren Hirnschnitt übergehend (Arn. 4 XVI. p. 412, b. Rehm 4 Nr. 89).

**F** Paneveggio: auf Erde eines grossen Porphyrblockes am Travignolo im lichten Walde vor dem Rollepasse (Arn. 4 XXI. p. 106, Exs. Nr. 785), auf Waldboden zwischen Paneveggio und Rolle sowie gegen Giuribell (Arn. 4 XXIII. p. 106, b. Rehm 4 Nr. 255).

c) *dilacerata* Schaer., *Cl. ceranoides prolifera dilacerata* Schaer., Enum. (1850) p. 198, *Cl. crispata* var. *divulsa* Nyl. p. p., *Cl. crispata* f. *dilacerata* Malbranche in Bull. soc. amis sc., nat. Rouen (1881) p. 14, *Cl. crispata*  $\delta$  *dilacerata* Wainio in Acta soc. fauna et fl. fenn. IV. (1887) p. 388. — Wainio l. c. I. p. 388.

**O** Arlberg: Verwallthal (Arn. 4 XXIX. p. 136, b. Rehm 4 Nr. 436); Paznaun: Jamthal (Arn. 4 XXVII. p. 108); Mittelberg: Taschachthal nicht selten (siehe die Species).