

cucullata Delise in Duby, Bot. gall. II. (1830) p. 626, Cl. squamosa f. cucullata Leight., Lich. Great Brit. 3. ed. (1879) p. 61, Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 114. — Wainio l. c. I. p. 421, 422, 424, 427.

**I** Volderthal (Strasser).

**P** Ehrenburg: mit der Stammart auf dem Boden von Waldblößen: f. denticollis, simpliciuscula, squamosissima (Kst. 4 VII. p. 289).

**D** Lienz: auf steinigem Boden zwischen Blöcken bei der Feldwäibelalpe: f. cucullata (Arn. 4 XVIII. p. 249).

**B** Ueberetsch: Eislöcher (Strasser).

**F** Paneveggio: an morschen Fichtenstrünken am Travignolo (Arn. 4 XXIII. p. 141, b. Rehm 4 Nr. 217 als f. cymosa: Arn. in Bayer. bot. Ges. IV. (1896) Rehm Clad. exs. p. 6); selten auf dem Holze alter Strünke zwischen Giuribell und Rolle: f. simpliciuscula Schaer. (Arn. 4 XXIII. p. 141, Exs. Nr. 973).

c) **phyllocoma** Rbh., Cl. squamosa  $\delta$  macrophylla D. phyllocoma Wainio in Acta soc. fauna et fl. fenn. IV. (1887) p. 441. — Wainio l. c. I. p. 441.

**C** Kühetai (Arn. b. Wainio l. c.).

**I** Innsbruck: gegen die Neunerspitze an Felsen zwischen Moosen (Pkt. Hb. F. als C. squamosa  $\alpha$  ventricosa, det. Arn.).

21. (57.) **C. caespiticia** (Pers.) Floerke, Comm. Clad. (1828) p. 8, Baecomyces caespiticius Pers. in Usteri, Ann. VII. (1794) p. 155, Capitularia caespiticia Floerke in Weber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1814) p. 277, Lichen fuscus Hoffm., Enum. Lich. ic. (1784) p. 39, excl. synonym., Cl. fusca Schrad., Spicil. (1794) p. 106, Lichen agariciiformis Wulf. in Jacq., Collect. IV. (1790) p. 234, non Vill., Cl. agariciiformis Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXII. (1882) p. 168. — Wainio l. c. I. p. 458 Nr. 79; Arn. Nr. 43.

**O** Kühetai: nicht häufig auf felsigem Boden unter den Alpenrosen im Längenthal (Arn. 4 XIV. p. 453).

**I** Innsbruck: Paschberg 28. Sept. 1841 und im Iglarwald bei der Taxburg 11. Aug. 1843 am Grunde halbmorscher Strünke und auf feuchtem Boden sowie zwischen Moosen (Pkt. Hb. F. als Cl. fusca, b. DT. 10 p. 277); die Angabe b. DT. 10 p. 277: „in silva Iglensi prope castellum Gandeck 1. Aug. 1835 (Hfl.)“ ist nicht belegt und bezieht sich übrigens auf Gandeegg in Eppan; Volderthal (Strasser).

**U** Zillerthal (Floerke 6 p. 279).

22. (58.) **C. parasitica** Hoffm., Lichen parasiticus Hoffm., Enum. Lich. ic. (1784) p. 39 excl. synonym., Cl. parasitica Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 127, Lichen delicatus Ehrh., Pl. crypt. exs. Nr. 247 (1793), Cl. delicata Floerke, Comm. Clad. (1828) p. 7, Cl. squamosa  $\epsilon$  delicata Kbr., Syst. (1855) p. 33, Par. p. 13 (1859). — Wainio l. c. I. p. 465 Nr. 80.

**G** Pinzolo: häufig auf modernden Kastanienstrünken c. ap. (Kst. 4 I. p. 330).

23. (59.) **C. cenotea** (Ach.) Schaer., Spicil. III. p. 35 (1823) p. p., Enum. (1850) p. 198 p. p., Baecomyces cenoteus Ach., Meth. (1803)