

**B** Auf Augitporphyrerde an der Campröder bei Seis (Hsm. b. Arn. 4 IV. p. 607, von Arn. nicht gesehen: Arn. 4 XXI. p. 116; Wainio 1 II. p. 402).

46. (82.) *C. strepsilis* (Ach.) Wainio in Acta soc. fauna et fl. fenn. X. (1894) p. 403, 404, 411, 470, *Baeomyces strepsilis* Ach., Meth. (1803) Suppl. p. 3. *Cl. pyxidata* var. *lutescens* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. (1877) p. 566, XXVIII. (1878) p. 270, XXX. (1880) p. 116, Arn. in Ber. bayer. bot. Ges. IV. (1896) Rehm Clad. exs. p. 16. — Wainio l. c. II. p. 403 Nr. 129; Arn. Nr. 888.

Auf hartem Boden der Centralalpen ziemlich verbreitet (Arn. 4 XVIII. p. 270).

**O** Gurgl: der sterile Thallus nicht häufig auf felsigem Boden am Aufstiege zur Hohen Mut (Arn. 4 XIX. p. 289), auf steinigem Boden am Fusse des Festkogels (Arn. 4 XXI. p. 98, Exs. Nr. 784; Wainio 1 II. p. 408).

**I** Brenner: der sterile Thallus auf hartem, felsigem Boden nicht weit vom Wilden See 2440 m (Arn. 4 XVII. p. 566, XXI. p. 96, b. Rehm 4 Nr. 104).

**P** Taufers: an den oberen Gehängen des Mostnock auf trockenem, steinigem Boden (Arn. 4 XIX. p. 277).

**D** Tauern: Möserlingwand (Arn. 4 XVIII. p. 270).

47. (83.) *C. botrytes* (Hagen) Willd., Fl. berol. (1787) p. 365, Lichen *botrytes* Hagen, Tent. hist. Lich. (1782) p. 121. Siehe auch Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXV. (1875) p. 482. — Wainio l. c. II. p. 412 Nr. 130; Arn. Nr. 40.

**I** Innsbruck: Paschberg (Pkt. Hb. F.), Iglerwald an halb morschen Strünken (Pkt. b. DT. 10 p. 275, Hb. F.), Heiligwasser an Baumstrünken (Hb. b. DT. l. c.); Waldrast: selten auf dem Hirnschnitte alter Baumstumpfen am Abhänge unter den Serleswänden (Arn. 4 XIV. p. 482).

**P** Ehrenburg: Kienberg auf Humus, auf morschem Holze (Kst. 4 VII. p. 290, 291); Prags (Wulf. 2 IV. p. 238, Brief vom 8. Juli 1790; siehe Arn. 4 XXII. p. 85), Pragersee (Lukasch); Ampezzo: auf dem Hirnschnitte morscher Föhrenstrünke bei Schluderbach (Arn. 4 XVI. p. 412, b. Rehm 4 Nr. 72).

**B** Jenesen: auf einem Lärchenstrunke am Krummenbühl (Kst. 4 III. p. 719); sparsam auf einem faulen Fichtenstamme im lichten Walde unter der Schlenklammer (Arn. 4 IV. p. 621).

**F** Predazzo: auf einem verhärteten *Boletus* im Walde gegen Ziano, auf dem Hirnschnitte von Tannenstrünken am Fusse der Margola; auf dem Hirnschnitte alter Strünke im Travignolothale und im Walde gegen Rolle (Arn. 4 XXIII. p. 149, 143, 141).

**G** Pinzolo: an Kastanienstrünken c. ap., häufig (Kst. 4 I. p. 330).

48. (84.) *C. carneola* Fr., *Cenomyce carneola* Fr., Lich. exs. Nr. 114 (1824), Sched. crit. (1824) p. 23, *Cl. carneola* Fr., Lich. eur. (1831) p. 233 a., *Capitularia pyxidata*  $\gamma$  *carneopallida* Floerke in Weber, Beitr. z. Naturk. II. (1810) p. 304, aber nach Wainio l. c. zum Theile zu *Cl. fimbriata ochrochlora* gehörig, *Cl. carneopallida* Laurer b. Sturm, Deutschl. Fl. II. Heft 27 (1832) p. 32 excl. synonym., Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVI. (1876) p. 412, XXXVII. (1887)