

dieser Flechte, insbesondere der Exemplare vom Vennathale; siehe Winter 2 p. 177 (Arn. 4 XVII. p. 567, XXI. p. 96; Thallus mit Cephalodien in Zwackh Exs. Nr. 524).

U Zillertal: Brunnhaus gegen den Grünberg, steril (Arn. 4 XXIV. p. 254).

K Kleiner Rettenstein: steril nicht häufig auf Erde des Gipfels (Arn. 4 X. p. 103).

M Sulden: Schutzwald ober St. Gertraud (Arn. 4 XXII. p. 67).

B Ritten: an Felsen am Gasterser Weiher (Hsm. b. Kbr. 3 p. 28).

15. Stictina Nyl.

1. (91.) *St. scrobiculata* (Scop.) Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 94, Flora XLVIII. (1865) p. 297, Lichen scrobiculatus Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) p. 384, Lobaria scrobiculata DC. in Lam. et DC., Fl. franc. 3. éd. II. (1805) p. 402, Sticta scrobiculata Ach., Lich. univ. (1810) p. 453, Nyl., Syn. II. (1859) p. 353, Lobarina scrobiculata Nyl. in Flora LX. (1877) p. 233. — Arn. Nr. 114.

O Oetzthal: beim Umhausner Wasserfalle, steril nicht selten am Grunde alter Lärchenstämme: pl. compacta, microlobata (Arn. 4 VII. p. 282, X. p. 110).

E Lüseneralpe (Sarnth. 3^e p. 189, det. Arn. in litt. 2. und 9. Dec. 1892).

P Ehrenburg: steril auf Thonschiefer am Getzenberge nicht selten, eine Wand völlig bedeckend (Kst. 4 VII. p. 280, 282; b. Kern. 78^a Nr. 3121, 78^b VIII. p. 90).

B Jenesien: auf Porphy am Wege nach Afing (Kst. 4 V. p. 337); Gröden: bei Wolkenstein auf Porphy, nur ein Exemplar (Arn. 4 XXX. p. 219).

F Im feuchten Walde unterhalb Paneveggio steril an jüngeren Fichten und an deren dünnen Zweigen (Arn. 4 XXI. p. 110).

G Pinzolo: auf Thonschiefer steril, spärlich (Kst. 4 I. p. 322).

2. (92.) *St. fuliginosa* (Dicks.) Nyl., Syn. II. (1859) p. 347, Lichen fuliginosus Dicks., Fasc. pl. crypt. 1. (1785) p. 13, Sticta fuliginosa Ach., Meth. (1803) p. 280. — Arn. Nr. 115.

O Pitzthal: an Blöcken zwischen Zaunhof und St. Leonhard ziemlich häufig (Arn. 4 XXIV. p. 262); Oetz: steril an Felsen im Walde gegen den Piburger See (Arn. 4 XIV. p. 435); Umhausen: steril in Menge an den Gneissblöcken in der Nähe des Wasserfalles (Stotter & Hfl. 1 p. 107; Hfl. b. DT. 10 p. 264, Hb. F.; Auerswald 4 p. 114 als Sticta silvatica; Hfl. und Auerswald b. Arn. 4 VII. p. 281).

I Innsbruck: in der Götznertklamm (Wagner), Heiligwasser an Felsen (Pkt. b. DT. 10 p. 264, Hb. F.).

E Brixen: Walderhof gegen Lüssen auf moosigem Waldboden (Sarnth. b. Kst. 6 p. 301, Hb. F.).

P Ehrenburg: auf Thonschiefer am Getzenberge, spärlicher als *St. scrobiculata*, von Simmer auf Erdboden bei Hofern gesammelt (Kst. 4 VII. p. 282, 290); Taufers: am Waldwege nach Rain auf Granit, steril, nicht häufig (Arn. 4 XIX. p. 275).

D Tauerntal: am Waldwege steril über Phyllitblöcken (Arn. 4 XVIII. p. 259).

B Villnöss: auf moosigem Waldboden bei Bad Froi (Sarnth. b. Kst. 6 p. 301, Hb. F.); Gröden: auf Porphy bei Innerpontifes (Arn. 4 XXVIII.