

c) *parile* (Ach.) Nyl., Syn. I. 2. (1859) p. 320, Lichen parilis Ach., Prodr. (1798) p. 164, Nephroma parilis Ach., Lich. univ. (1810) p. 522. Siehe Arn. in Flora LIV. (1871) p. 483.

O Stanzerthal: ober der vorderen Hütte der Thaja im Malfontale an Rhododendron (Arn. 4 XXV. p. 397); Mittelberg: auf Erdboden, nicht besonders häufig, steril auf Rhododendron: Exs. Nr. 621, steril auf Juniperus nana (Arn. 4 XVII. p. 541, 543, 545); Gurgl: von den Blöcken hie und da auf bemoosten Boden übersiedelnd, auf Rhododendron steril hie und da gegenüber dem Dorf und am Langthaler Eck (Arn. 4 XV. p. 371, 377).

I Waldrast: steril an bemoosten Glimmerschieferblöcken am Waldsaume gegen Matrei (Arn. 4 XI. p. 486); Brenner: auf Erde zwischen Gneissblöcken am Waldsaume im Vennathale nur steril (Arn. 4 XIII. p. 255).

K Kleiner Rettenstein: auf Rhododendron sparsam und steril bei der Alpe, eine Stunde oberhalb Pass Thurn (Arn. 4 XIV. p. 488).

E Brixen: zwischen dem Walderhof und Lüsen, hinteres Lüsen auf Schiefererdboden (Sarnth. b. Kst. 6 p. 301, Hb. F.).

P Ehrenburg: auf Erdboden an mehreren Orten, über Moos am Getzenberge (Kst. 4 VII. p. 290, 287).

D Tauern: am Schlattenkees auf Rhododendron (Arn. 4 XVIII. p. 262); Lienz: über bemoosten Glimmerschieferblöcken am Wege zur Feldwabelalpe (Arn. 4 XVIII. p. 248).

B Ueberetsch: Eislöcher steril auf Rhododendron (Arn. 4 VIII. p. 302).

G Pinzolo: auf Castanea bei S. Stefano (Kst. 4 I. p. 326).

d) *papyraceum* (Hoffm.) Kbr., Syst. (1855) p. 55, Par. p. 23 (1859), Peltigera papyracea Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 108, Nephromium resupinatum s. papyraceum Schaer., Enum. (1850) p. 19.

B Bozen: Sigmundskron steril über Moos an Felsen (Kst. 2 p. 10); Eggenthal: an dünnen Fichtenzweigen im Walde beim oberen Karrersee (Arn. Exs. Nr. 1760^b); Eislöcher (Strasser).

17. Nephroma Ach.

1. (96.) *N. expallidum* Nyl. in Flora XLVIII. (1865) p. 428, LII. (1869) p. 412, Nephromium expallidum Nyl., Syn. I. 2. (1859) p. 318. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXV. (1875) p. 454. — Arn. Nr. 118.

O Mittelberg: steril auf felsigem, bemoostem Boden am Wege zum Taschachgletscher (Arn. 4 XVII. p. 541); Kühetal: vereinzelt und steril an überfluteten Blöcken am Ausflusse des oberen Plendelsees, steril auf steinigem Boden des Abhanges ober dem Plendelsee mit Cetraria islandica, Sticta linita, Peltidea aphthosa, Rhinodina mniaraea bei 2500 m (Arn. 4 XIV. p. 448, 454); Gurgl: auf bemoostem Boden der Hohen Mut (Arn. 4 XV. p. 371, Exs. Nr. 528^a).

18. Peltigera Willd.

1. (97.) *P. canina* (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 106, Kbr., Syst. (1855) p. 58, Par. p. 23 (1859), Lichen caninus L., Spec. pl. (1753) p. 1149, Peltidea canina Ach., Lich. univ. (1810) p. 517. — Arn. Nr. 119.