

O Arlberg: Verwallthal an Fichten (Arn. 4 XXIX. p. 141), an Lärchen zwischen St. Jakob und Pettneu und im Malfontthale (Arn. 4 XXV. p. 393); Paznaun: an Fichten unter Galtür (Arn. 4 XXVII. p. 106); Kühetai: hie und da an Zirbenrinde (Arn. 4 XIV. p. 465); Umhausen, Wasserfall: nicht häufig an jüngeren Lärchenstämmen, nicht selten an älteren Fichten (Arn. 4 XIV. p. 110).

I Innsbruck: Höttingerberg an Tannen (Hfl. b. Kbr. 3 p. 19), Iglerswald an Birken (Pkt. Hb. F. als *C. glauca*, b. DT. 10 p. 261), Patscherkofel an Baumstrünken (Hfl. Hb. F. als *C. glauca*); Waldrast: hie und da an Fichtenrinde im Walde unter den Serleswänden, eine abweichende Form auf bemooster Rinde der älteren Lärchenstämme gegenüber der Waldrast: Exs. Nr. 484 (Arn. 4 XI. p. 510, 513); Öbernberg an dünnen Lärchenzweigen bei den Seen (Arn. 4 XIII. p. 276).

U Vorderes Sonnwendjoch: an den oberen Zweigen von *Acer pseudo-platanus* (Arn. 4 XII. p. 524).

K Pass Thurn an Fichten, auch auf ganz dünne Zweige vorgehend (Arn. 4 XIV. p. 490).

P Ehrenburg: auf *Larix*, *Betula* (Kst. 4 VII. p. 291, 294; b. Kern. 78^a Nr. 3116, 78^b VIII. p. 89); Taufers: auf Phyllit unterhalb Rain sparsam zwischen Moosen (Arn. 4 XIX. p. 277); Ampezzo: zwischen Schluderbach und Ospedale nicht häufig an Fichten- und *Larix*-Rinde (Arn. 4 XVI. p. 407).

D Auf morschen Lärchenstrünken im Walde oberhalb Windischmatrei zwischen anderen Laubflechten, besonders *Parmelia physodes* (Arn. 4 XVIII. p. 250).

N Monte Roën an Lärchen (Arn. 4 XXX. p. 214).

B Sarnthal: Möltnerkaser an Fichten und Lärchen steril (Kst. 4 VI. p. 207); Gröden: an Fichtenzweigen in der Puflesschlucht bei St. Ulrich (Zahlbr. b. Beck & Zahlbr. 1^a Nr. 463, 1^b XV. p. 185, b. Arn. 1 Nr. 484^b); an verschiedenen Nadelhölzern bei Seis und Ratzes (Hsm. Hb. F.), an Fichten bei Seis (Hsm. b. Baglietto, Cesati & De Notaris 1 II. Nr. 464, siehe Arn. 4 XX. p. 385), ziemlich häufig längs des Waldweges unterhalb Ratzes an Fichten (Arn. 4 IV. p. 621; b. Rbh. Exs. Nr. 819; Hfl. b. Arn. 4 IV. p. 621); Hinteres Eggenthal: auf Lärchenzweigen (Kst. 4 II. p. 341).

F Paneveggio: an abgedorrten Fichtenzweigen, ziemlich selten (Arn. 4 XX. p. 370).

G Pinzolo: Corno alto auf *Abies*, Doss Sabbione auf *Betula* (Kst. 4 I. p. 338, 329).

6. (133.) *C. Oakesiana* Tuckerm. in Boston Journ. Nat. Hist. III. (1841) p. 445, Kbr., Syst. (1855) p. 48, Par. p. 19 (1859), *Platysma Oakesianum* Nyl., Syn. I. 2. (1859) p. 302, *C. bavarica* Kph. in Flora XXXIV. (1851) p. 273. — Arn. Nr. 72.

P Bruneck auf Holz (Simmer b. Kst. 4 VII. p. 291).

B Sarnthal: an Lärchen bei der Möltnerkaser (Kst. 4 VI. p. 207); Eislöcher, sehr selten, nur ein steriles Exemplar auf einem Rhododendronstämmchen bemerkt (Arn. 4 VIII. p. 302); Eggenthal: an Tannen im Karrerwald (Kst. 4 VI. p. 217).

F Predazzo: steril am Grunde älterer Tannen am Wege zur Alpe Val Maor, auf Porphyrt (Arn. 4 XXI. p. 107, Exs. Nr. 786); Paneveggio: steril am Grunde alter Fichten der Strasse gegen Rolle (Arn. 4 XXI. p. 109).