

7. (134.) *C. juniperina* (L.) Ach., Meth. (1803) p. 41, Kbr., Syst. (1855) p. 47, Par. p. 18 (1859) excl. var., Lichen juniperinus L., Spec. pl. (1753) p. 1147, *Platysma juniperinum* Nyl., Syn. I. 2. (1859) p. 312. — Arn. Nr. 73.

L Grenzkamm: Obermädelejoch auf Erdboden 1950 m, steril (Rehm 1 p. 93); Aggenstein bei Vils (Britzelm. 3 p. 89).

O Stanzertal: Almejurjoch, Kalk auf Erdboden 2224 m (Arn. 4 XXV. p. 391); Kühetai: auf Erde, besonders gerne auf den kleinen Erdhügeln in der *Vaccinium*-region (Arn. 4 XIV. p. 454); Gurgl: auf Erde mit anderen Strauchflechten (Arn. 4 XV. p. 370).

I Karwendel c. ap. (Gattinger b. Kph. 4 p. 121); Brandjoch (Hf. Hb. F.), Frauhitt (Hf. b. Pkt. 6 p. 138, Giovanelli), Saile auf der Erde zwischen Geschiebe (Pkt. 6 p. 138, b. DT. 10 p. 262, Hb. F.); Waldrast: bis auf den Serlesgipfel (Arn. 4 XI. p. 496), auf Erde in der Serles-, Matreiergrube und besonders auf dem Blaser (Arn. 4 VI. p. 1117, Sarnth. Hb. F.), ober Trinser Markung (Arn. 4 XVII. p. 563); Brenner: steril auf steinigem Boden ober der Baumregion (Arn. 4 XIII. p. 254).

U Achenthal: Pfonserjoch (Wagner); Gipfel des vorderen Sonnwendjoches, steril auf steinigem Boden, auch zwischen Moosen (Arn. 4 XII. p. 531); Treffauerspitze im Kaisergebirge (R. Schlagintweit 1 p. 571).

K An *Juniperus* und anderen Alpensträuchern, auch auf der Erde (Ung. 8 p. 256); Grosser Rettenstein: auf Erde des Gipfels, mit Spermogonien (Arn. 4 V. p. 533); Kleiner Rettenstein: steril nicht selten auf Erde des Gipfels (Arn. 4 X. p. 103).

P Prags: „nulla illo fere arbor caret, saepius florentem inveni“ (Wulf. 2 IV. p. 249; siehe Arn. 4 XXII. p. 86); Ampezzo (Arn. 4 XVI. p. 401).

[**D** Grossglockner (Wulf. nach Arn. 3 Nr. 33 p. 141).]

B Rittneralpe (Hsm. Hb. F.); Gröden: Sellajoch auf Dolomitenboden am Fusse der Fünffingerspitze (Arn. 4 XXVIII. p. 113); Schlern: auf steinigem Boden im Damers (Arn. 4 IV. p. 633); am Wasserfalle bei Salurn (Martens 1 p. 354).

F Paneveggio: Rollepass auf Erdboden über Sandstein und Mergelkalk (Arn. 4 XXIII. p. 126).

b) *alvarensis* (Wahlenb.) Fr., Summa veget. succ. (1845) p. 104, Lichen juniperinus β *alvarensis* Wahlenb., Fl. succ. (1826) p. 827, *Cetraria alvarensis* Fr. l. c. p. 104, *C. juniperina* β *alvarensis* Th. Fr., Lich. scand. p. 104 (1871), *Platysma alvarensis* Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 83, *Cetraria juniperina* γ *tubulosa* Schaer., Spicil. VII. (1836) p. 372, Enum. (1850) p. 13, *Platysma juniperinum* forma *tubulosum* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 116.

V Algäuer Grenze: am Gipfel des Ifen 2166 m (Gümbel b. Kph. 4 p. 121).

L Grenzkamm: Obermädelejoch am Boden, 1950 m (Rehm b. Kbr. 3 p. 18; Rehm 1 p. 93; b. Rbh. 6 Nr. 472).

I Karwendel (Kph. b. Kbr. 3 p. 18); Waldrast: ziemlich selten steril auf Kalkglimmerschieferboden oberhalb Trinser Markung in Gesellschaft anderer Strauchflechten: *Cladonia stellata*, *Cl. rangiferina*, *Cl. furcata*, *Cetraria auleata*, *Dufourea ramulosa*, *Stereocaulon alpinum* (Arn. 4 XIV. p. 475, 479).