

Giuribritt an den obersten Zweigen einer alten Fichte: Exs. Nr. 581<sup>d</sup>, steril auf einem Porphyrblocke unter einer alten Fichte am Abhänge vor dem Rollepasse, östlich ober Rolle vereinzelt auf Juniperus nana (Arn. 4 XXIV. p. 265, 263, 266).

**G** Pinzolo: S. Stefano auf Castanea steril, Pinzolo auf Morus, Doss Sabbione auf Alnus steril (Kst. 4 I. p. 326, 325).

**T** Andalo an Tannen (Kst. 4 V. p. 329); Lavarone an Larix (Kst. 4 VI. p. 215).

**R** Folgaria: San Sebastiano an Larix (Kst. 4 VI. p. 215).

26. (166.) **P. fuliginosa** (Fr.), *Parmelia olivacea* γ *fuliginosa* Fr. in Duby, Bot. gall. II. (1830) p. 602, *P. fuliginosa* Nyl. in Flora LI. (1868) p. 346, *Imbricaria fuliginosa* Arn. in Flora LIII. (1870) p. 210. — Arn. Nr. 99.

**V** Brand bei Bludenz (Hesse 1 Bd. 58 p. 473).

**L** Plansee: auf Fagus, Sorbus aria, Berberis, Fichten, Legföhren, Eiben (Arn. 4 XXIX. p. 123, 125, 126, 127, 128).

**O** Stanzenthal: an Fichten, Zaunholz und Rhododendron (Arn. 4 XXV. p. 392, 400, 396, 399, Exs. Nr. 1547: Pettneu); Sölden: auf Brettern am Kirchhofe, dürrig und steril (Arn. 4 XIX. p. 292).

**I** An Erlen am Inn bei Inzing (Arn. 4 XVII. p. 560); Rosskogel: an Lärchenästen (Arn. 4 III. p. 951 als *I. olivacea*: Arn. 4 XXI. p. 118); Innsbruck: Igls an Zaunholz und Baumrinden (Pkt. Hb. F. als *P. olivacea* und *P. corrugata*; b. DT. 10 p. 268), auf Schiefer (Pkt. Hb. F. mit *P. conspersa*); Waldrast: steril hje und da an Glimmerschiefer gegen Matrei hinab, zahlreich, doch meist steril an Lärchen- und Fichtenzweigen, in Spuren an der hölzernen Brunneneinfassung (Arn. 4 VI. p. 1105, 1137, 1143, XI. p. 511, 513).

**U** Brandenburg: an Sorbus aucuparia und Pirus malus (Arn. 4 XXX. p. 211, 212); Vorderes Sonnwendjoch: an Bäumen (Arn. 4 XII. p. 524); Kufstein: gegen den Hintersteiner See an Obstbäumen (Arn. 4 I. p. 705 als *I. olivacea*: XXI. p. 118); Zillerthal: auf Alnus incana zwischen Karlssteg und Ginzling (Arn. 4 XXIV. p. 256).

**E** Schabs, auf Granit (Sarnth. b. Kst. 6 p. 301, Hb. F.).

**P** Ehrenburg: auf Thonschiefer, Holz und der Rinde vieler Holzpflanzen (Kst. 4 VII. p. 281, 291, 294); Ampezzo: steril an dünnen Fichtenzweigen zwischen Schluderbach und Ospedale 1445 m (Arn. 4 XVI. p. 407).

**D** Windischmatrei: auf Alnus incana, steril (Arn. 4 XVIII. p. 250).

**B** Sarnthal: Möltnerkaser an Fichten (Kst. 4 VI. p. 208); Jenesien: auf Porphy, merkwürdiger Weise auf den benachbarten Föhren nicht, wohl aber auf entfernter stehenden Lärchen, auf Sandstein, auf Holz, auf Pinus abies, Larix, Fagus c. ap., cum isidio normali, Betula, Tilia parvifolia, Fraxinus ornus, Prunus avium (Kst. 4 III. p. 703, 713, 719, 720, 723, 726, 727, 731, 734), auf Sandstein, Porphy, Picea alba, Fagus, Betula, Prunus avium c. ap., P. domestica, Pirus malus c. ap., Acer pseudoplatanus c. ap. (Kst. 4 V. p. 333, 337, 340, 341, 342, 344, 345, 347), auf Porphy, Sorbus aucuparia, Juniperus, Lonicera xylosteum, L. alpigena, Zaunholz (Kst. 4 VI. p. 218, 221, 222, 223, 224); Bad Froi in Villnöss auf Schiefer (Sarnth. b. Kst. 6 p. 301); steril auf dem Porphygerölle bei Innerpontifes in Gröden (Kst. 4 II. p. 341), ebendort c. ap. (Arn. 4 XXVIII. p. 120); Schlerengebiet: an Birken bei Seis: Hsm., an Erlen: Milde, an Zirbenstumpfen