

einer Kalkwand nicht weit vom ersten See (Arn. 4 XIII. p. 269, XXI. p. 121 als Ph. murorum f. pulvinata: XXX. p. 364).

K An Kalkfelsen bei Kitzbühel (Zwackh b. Arn. 4 XXX. p. 364); Kleiner Rettenstein: hie und da an den Phyllitwänden am Wege zum Rossgrubkogel (Arn. 4 X. p. 92 als Ph. murorum f. lobulata: XXX. p. 364).

M Sulden: an Kalkblöcken bei St. Gertraud (Arn. 4 XXII. p. 69).

P Taufers: häufig an Blöcken der Strassenmauern in Sand, an Feldmauern bei Rain (Arn. 4 XIX. p. 273, 277, XXI. p. 121 als Ph. murorum f. lobulata: XXX. p. 364); Buchenstein oder Predazzo (Molendo b. Arn. 2 p. 460).

D An Mauersteinen längs des Weges im Tauernthale (Arn. 4 XVIII. p. 259, XXI. p. 121 als Ph. murorum f. lobulata: XXX. p. 364).

B Sarnthal: östliche Kaserböden auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 194); Schlern: auf Spilit im Damers, auf Kalk und Dolomit nicht häufig, doch noch an Kalkfelsen beim Heubade 2540 m, an Dolomitblöcken ober der Seiser Alpe (Arn. 4 IV. p. 617, 639, XXI. p. 121 als Ph. murorum f. lobulata: XXX. p. 364); Bozen: ziemlich selten an Porphyrböckchen oberhalb Gries (Arn. 4 VIII. p. 288 ebenso: XXX. p. 364); selten an Porphyrböckchen der Eislöcher (Arn. 4 X. p. 113 ebenso: XXX. p. 364).

F Predazzo: am Grunde eines grossen Syenithblockes am Fusse der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 83 Nr. 18, Exs. Nr. 1035 als Ph. miniata f. tegularis: XXX. p. 364; Fünfstück 2 p. 317, 167), siehe auch **P**; Panegaggio: Rollepass, Sandstein und Mergelkalk, an Felsbänken in der Mulde am südlichen Absturze (Arn. 4 XXIII. p. 120 Nr. 3 als Ph. miniata: XXX. p. 364).

R Arco: auf Kalk am alten Wege nach Nago (Kst. 4 VII. p. 305).

b) **obliterata** (Smft.) nob., Lecanora oblitterata Smft., Suppl. fl. lapp. (1826) p. 87, Physcia pusilla f. oblitterata Arn. in Denkschr. bot. Ges. Regensburg VI. (1890) p. 58. Vergl. Parmelia miniata β oblitterata Ach., Meth. (1803) p. 194.

O Paznaun: an bemoosten Glimmerschieferblöcken links von der Strasse unterhalb Galltür, nicht häufig (Arn. 4 XXVII. p. 107).

B Gröden: auf Porphyrr bei Innerpontifes (Arn. 4 XXVII. p. 120, 121).

c) **discernenda** (Nyl.) nob., Lecanora discernenda Nyl. in Flora LXIX. (1886) p. 98, Physcia discernenda Nyl. b. Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. 1887 p. 83, Ph. pusilla b. discernenda Arn. ibid. LXVII. (1897) p. 356.

F Predazzo: sparsam am Grunde eines Syenithblockes am Fusse der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 83).

8. (220.) **G. granulosa** (Müll.-Arg.) Sydow, Flecht. Deutschl. (1887) p. 74, Amphiloma granulosum Müll.-Arg. in Mém. soc. phys. Genève XVI. (1862) p. 383, Flora XL. (1867) p. 562, non Parmelia elegans var. granulosa Schaer. — Arn. Nr. 168.

R Auf Kalk am alten Wege von Arco nach Nago und am Abhange ober Torbole (Kst. 4 VII. p. 305); Ponale bei Riva: steril hie und da; Slavini di S. Marco bei Mori an Kalkblöcken, steril hie und da (Arn. 4 IX. p. 310, 305).