

11. (223.) *G. medians* (Nyl.) Zahlbr. in Ann. naturhist. Hofmus. Wien V. (1890) p. 27, *Placodium medians* Nyl. in Bull. soc. bot. France IX. (1862) p. 262, *Lecanora medians* Nyl. in Flora LXIV. (1881) p. 452, *Physcia medians* Arn. in Flora LVIII. (1875) p. 150, *Caloplaca medians* Flagey in Revue mycol. X. (1888) p. 133, *C. (Gasparrinia) medians* Zahlbr. l. c. p. 27. — Arn. Nr. 907.  
**R** Auf Kalkblöcken bei Mori (Arn. 4 XXIX. p. 130).

### 36. *Caloplaca* Th. Fr.

(*Calopisma* De Not. 1851\*) *inclus. Pyrenodesmia* Mass.)

1. (224.) *C. flavovirescens* (Wulf.) Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 219, *Lichen flavovirescens* Wulf. in Schrift. Ges. naturforsch. Fr. Berlin VIII. (1787) p. 122, in Jacq., Collect. II. (1788) p. 230 tab. 13 et 14 non Dicks. (1793), *Lecanora aurantiaca*  $\gamma$  *flavovirescens* Schaer., Enum. (1850) p. 149, *Calopisma aurantiacum*  $\gamma$  ( $\beta$ ) *flavovirescens* Mass. in Atti Istit. veneto 2 ser. III. (1852) App. III. p. 71, Kbr., Syst. (1855) p. 130. Par. p. 66 (1859), *Calopisma flavovirescens* Mass., Sched. crit. (1856) p. 133, *Lichen erythrellus* Ach., Prodr. (1803) p. 43. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIII. (1873) p. 111. — Arn. Nr. 179.

**O** Stanzerthal auf Schiefergestein: Peltneu 1212 m, Flirsch an wenig überfluteten Blöcken, zwischen Strengen und Pians (Arn. 4 XXV. p. 363, 384, 360, 361).

**I** Zirl: an einer Kalkmauer (Zopf 2 Bd. 297 p. 290); Innsbruck: auf Phyllitfelsen beim Reisachhof hinter dem Berg Isel (Prantner Hb. F. als *Parmelia aurantiaca*; b. DT. 10 p. 265), Sonnenburger Hügel (Sarnth. Hb. F.), Ahrnthal (Pkt. Hb. F. als *P. aurantiaca*  $\beta$  *flavofusca*; b. DT. 10 p. 265); Matrei: an Glimmerschieferblöcken gegen Steinach (Arn. 4 XI. p. 485); Trins, auf Glimmerschiefer (Sarnth. b. Kst. 6 p. 302, Hb. F.); Obernberg: auf Kalkblöcken beim vorderen See (Arn. 4 XXIX. p. 131).

**U** Zillertal: Finkenberg (Floerke 3 p. 142).

**K** Kitzbühel, siehe *C. aurantiacum* (vergl. Ung. 8 p. 250 Nr. 533); Geisstein (Zwaekh).

**M** Meran: an Glimmerschiefersteinen einer sonnigen Mauer der Ruine Brunnenburg (Arn. 4 XXII. p. 62), bei Schloss Forst (Eggerth b. Kern. 78<sup>a</sup> Nr. 2740, 78<sup>b</sup> VII. p. 93).

**E** Brixen: auf Granit bei Schabs, Schiefer bei Seeburg, im hinteren Lüssen auf Porphy (Sarnth. b. Kst. 6 p. 302, Hb. F.).

**P** Ehrenburg: auf Thonschiefer der Steinmauer am Marbacher Sattel und gegen Kiens (Kst. 4 VII. p. 282).

**D** Tauern: Proseck auf Chloritschiefer nicht häufig (Arn. 4 XVIII. p. 252).

**B** Jenesien: auf Porphy und Sandstein (Kst. 4 III. p. 704, 713, V. p. 337); Gröden: auf Porphy bei Innerpontifes (Sarnth. b. Kst. 6 p. 302; Arn. 4 XXVIII. p. 120); an Melaphyr in Ratzes, sehr selten (Milde 29 p. 20; von Arn. nicht erwähnt), auf Augitporphyrböcken am Waldwege von Ratzes nach Seis, auch am Heuwege (Arn. 4 IV. p. 609); Bozen: auf jeglichem Gestein sowie auf altem Mauermörtel

\*) Dieser Name wurde bereits i. J. 1827 von Martius an eine Gattung der Gontianaceen vergeben.