

I An Bretterplanken des Brunnens bei der Waldrast mit *C. cerina* (Arn. 4 VI. p. 1143).

E Sterzing: an Zäunen gegen die Pfarrkirche (Hsm. Hb. F., det. Poetsch).

P Ehrenburg: auf Holz, „subfrequens“ (Kst. 4 VII. p. 291); an Brettern bei Schluderbach nicht selten (Arn. 4 XVI. p. 413).

B Bozen: auf altem Holz nicht häufig: Talfermauer, Calvarienberg (Kst. 2 p. 16); Ueberetsch: Reinsberg gegen Eppan an einem Bretterzaun (Strasser); Hinteres Eggenenthal auf Planken (Kst. 4 II. p. 342).

G Pinzolo: an Bretterplanken (Kst. 4 I. p. 332); Ragoli, an Holzwänden (Kst. 4 V. p. 329).

d) *microcarpa* Anzi, *Callopisma luteoalbum* var. *microcarpa* Anzi, Catal. lich. sondr. (1860) p. 42, *Callopisma pyraceum* f. *microcarpon* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIII. (1873) p. 497.

O Gurgl: sparsam über veralteter *Saxifraga bryoides* längs eines Felskammes der Hohen Mut (Arn. 4 XV. p. 372), ober der Granatenschneide 2380 m im Gebiete des krystallinischen Kalkes über *Saxifraga oppositifolia* und *S. bryoides* (Arn. 4 XIX. p. 291).

I Waldrast: a) hie und da über veralteten Moosen und Gräsern auf dem Blaser, b) ziemlich häufig auf *Saxifraga caesia* und *S. oppositifolia* längs des Kalbjoches: Exs. Nr. 450, 451, c) desgleichen auf Trinser Markung und am Serlesgipfel, sparsam auf abgedorrtten Dryasblättern ober der Matreier Grube (Arn. 4 XI. p. 495, 497, 503); Brenner: ziemlich selten über *Saxifraga oppositifolia* längs der Bergschneiden mit *Lecanora Hageni* f. *Saxifragae* (Arn. 4 XIII. p. 257).

P Ampezzo: selten über abgedorrtten Phanerogamen auf dem Monte Piano, Zumelles, an letzlerem Standorte auch parasitisch auf *Synechoblastus polycarpus* (Arn. 4 XVI. p. 402, 413).

D Tauern: Möserlingwand über veralteter *Saxifraga bryoides* (Arn. 4 XVIII. p. 271 bei Nr. 10; im Verz. XXI. nicht erwähnt), Rottenkogel (Arn. 4 XVIII. p. 256).

B Gröden: Sellajoch am Fusse der Fünffingerspitze an *Draba tomentosa* und *Saxifraga squarrosa* (Arn. 4 XXVIII. p. 113).

F Fassa: Monzoni auf abgedorrtten Theilen von *Androsace helvetica* über Dolomittfelsen (Arn. 4 XX. p. 368); Predazzo: Monte Cavignon auf abgedorrtten Blattrosetten von *Saxifraga aizoon* und *S. squarrosa*, Predazzo und Paneveggio im Porphyrgebiete über der Waldgrenze auf Moosen und Gräsern, auf abgedorrtten Rosetten von *Saxifraga aizoon* längs der obersten Porphyrschneide links oberhalb Bocche, Vineghie, Kalk über Moosen und Phanerogamen (Arn. 4 XXIII. p. 149, 116, 149, 137).

11. (234.) *C. vitellinula* (Nyl.) Th. Fr., Lich. scand. p. 179 (1871), *Lecanora vitellinula* Nyl. in Flora XLVI. (1863) p. 305, *Callopisma vitellinum* Arn. ibid. LXVII. (1884) p. 127.

L Auf dem Schönkahler bei Vils vom Wiesenplateau bis zur Spitze (Britzelm. 3 p. 103).

B Jenesien: auf Sandsteinblöcken längs des Waldweges nach Glaning, auf *Populus tremula* am Krummenbühel (Kst. 4 III. p. 713, 728).

F Predazzo: auf der Oberfläche der Syenitblöcke im Bachbette des Travignolo am Fusse der Margola (Arn. 4 XX. p. 356 Nr. 3 als