

D Tauern: auf Chloritschiefer bei Proseck, selten in kleinen Exemplaren (Arn. 4 XVIII. p. 252).

B Bozen: sehr selten an Porphyrböcken oberhalb Gries (Arn. 4 X. p. 111).

16. (239.) *C. pererocata* (Arn.) Zahlbr. in Ann. naturhist. Hofmus. Wien XV. (1900) p. 186, *Blastenia arenaria* var. *pererocata* Arn., Exs. Nr. 924 (1882), *B. pererocata* Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 309, *Lecanora pererocata* Zwackh, Exs. Nr. 829 (1884). — Arn. Nr. 910.

F Paneveggio: Sandstein und mergeliger Kalk am Rollepasse, auf kleineren und grösseren Steinen nicht selten (Arn. 4 XXIII. p. 120, Exs. Nr. 924; b. Zwackh 1 Nr. 829; Lojka b. Kern. 78^a Nr. 2743, 78^b VII. p. 94; Rieber b. Beck & Zahlbr. 1^a Nr. 465, 1^b XV. p. 186).

17. (240.) *C. erythrocarpia* (Pers.) Th. Fr., Lich. scand. p. 181 (1871), *Patellaria erythrocarpia* Pers. in Ann. Ges. Wetterau II. (1810) p. 12, *Lecidea erythrocarpia* Pers. in Ach., Lich. univ. (1810) p. 205, *Parmelia erythrocarpia* Fr., Lich. eur. (1831) p. 119, *Blastenia erythrocarpia* Kbr., Syst. (1855) p. 183, Par. p. 125 (1860), *Lichen arenarius* Pers. in Usteri, Ann. d. Bot. VII. (1794) p. 27 non Retzius, Prodr. (1779) p. 292, *Blastenia arenaria* Mass. in Atti Istit. veneto 2. ser. III. (1852) App. III. p. 213, Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 308, Ber. bay. bot. Ges. VIII. (1891) Lichfl. München p. 47 und Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 366, *Caloplaca arenaria* Müll.-Arg. in Mém. soc. phys. Genève XVI. (1862) p. 390. — Arn. Nr. 189.

B Jenesien: ober dem Dorfe auf Jaspis (Kst. 4 III. p. 705); Bozen: selten an Porphyrböcken oberhalb Gries (Hsm. b. Kst. 2 p. 21; Arn. 4 VIII. p. 289; Kst. 4 V. p. 331).

18. (241.) *C. ferruginea* (Huds.) Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 223, *Lichen ferrugineus* Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) p. 526, *Lecidea ferruginea* Smft., Suppl. fl. scot. (1826) p. 168, *Parmelia ferruginea* Fr., Lich. eur. (1831) p. 170 p. p., *Blastenia ferruginea* Kbr., Syst. (1855) p. 183, *Placodium ferrugineum* α *cinereofuscum* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 400 (1857), siehe Kbr., Par. p. 126 (1860). — Arn. Nr. 190.

P Ehrenburg: auf Holz vereinzelt, auf Kirschbaumrinde (Kst. 4 VII. p. 291, 295); Schluderbach: an *Salix caprea* (Arn. 4 XXII. p. 83).

D Windischmatrei: an *Alnus incana* (Arn. 4 XVIII. p. 251).

B Jenesien: an *Prunus avium* (Kst. 4 V. p. 344), Zaunholz (Kst. 4 VI. p. 220, 224); Schlerengebiet: an *Fraxinus ornus* und *Alnus incana* am Badehause von Ratzes (Milde 29 p. 8, 20; b. Arn. 4 IV. p. 622), sparsam auf einem Zirbenstrunke ober der Sesselhütte (Arn. 4 IV. p. 622); Bozen: auf Laubböckern gemein: auf *Populus*, *Fraxinus*, *Ostrya* und *Quercus* in der Kaiserau und Rodlerau sehr gemein, in Runkelstein (Kst. 2 p. 21; 4 VII. p. 303), an Kirschbäumen der Kaiserau (Kst. 4 V. p. 331), Kaiserau, auf *Populus nigra* (Kst. 4 VI. p. 210).

F Predazzo: auf *Rhododendron* am Fusse der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 146); Paneveggio: an *Sorbus aucuparia*, an dickeren Fichtenzweigen am Waldsaume vor dem Rollepasse (Arn. 4 XXIII. p. 145, 140), nicht häufig auf Porphyrböcken an der Südseite des Colbriccon (Arn. 4 XXIII. p. 97, XXX. p. 366).