

K Kleiner Rettenstein: selten an Rhododendron (Arn. 4 XIV. p. 488, XXI. p. 123).

P Ehrenburg: auf Rinde von Larix, Juniperus, Populus, Sambucus racemosa, Prunus padus, Rhamnus (Kst. 4 VII. p. 295); Ampezzo: zwischen Schluderbach und Ospedale 1445 m nicht selten an Fichten- und Lärchenzweigen: Exs. Nr. 345^b, hie und da auch an Baumrinde (Arn. 4 XVI. p. 407, XXI. p. 123).

N Penegal, auf Zweigen (Arn. 4 XXX. p. 213, Exs. Nr. 1580^b).

B Sarntal: Moltneralpen an Fichten, Lärchen, Legföhren (Kst. 4 VI. p. 208, 206); Jenesien: an Zaunholz, Fichten, Föhren, Lärchen, Birken, Fraxinus ornus, Prunus spinosa, P. avium (Kst. 4 III. p. 719, 721, 722, 723, 728, 731, 734), Tannen, Larix, Fagus, Betula, Fraxinus excelsior, Corylus, Berberis, Rosa canina (Kst. 4 V. p. 340, 341, 342, 346, 348, 349), Larix, Pinus silvestris (Kst. 4 VI. p. 221; b. Kern. 78^a Nr. 2742, 78^b VII. p. 94), Abies, Juniperus, Berberis, Lonicera alpigena (Kst. 4 VI. p. 220, 222, 223); Gröden: St. Ulrich an Lärchenrinde (Arn. 4 XXVIII. p. 122); Schlern: ziemlich häufig an den Zweigen der jüngeren Lärchen, welche auf dem oberen Schutthügel in der Schlernklamm stehen (Arn. 4 IV. p. 623, Exs. Nr. 345^a); Eislöcher: an Rhododendron dürftig (Arn. 4 VIII. p. 203, XXI. p. 123); Weissenstein gegen Aldein auf Larix (Kst. 4 VI. p. 213).

F Paneveggi: auf Alnus incana (Arn. 4 XXI. p. 107, 123), Rollepäss an Juniperus nana (Arn. 4 XXIV. p. 266).

T Andalo an Tannen (Kst. 4 V. p. 329); Lavarone an Larix (Kst. 4 VI. p. 215).

R San Sebastiano bei Folgaria an Larix (Kst. 4 VI. p. 215).

20. (243.) *C. Jungermanniae* (Vahl) Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 221, Lichen Jungermanniae Vahl in Nat. Salsk. Skrift. II. (1792) p. 29, Oeder, Fl. dan. tab. 1063 (1808), Lecidea Jungermanniae Ach., Meth. (1803) p. 70, L. cinereofusca β jungermanniae Ach., Lich. univ. (1810) p. 203, L. fuscolutea α Ach., Syn. (1814) p. 42 p. p., Blastenia fuscolutea Kbr., Par. p. 128 (1860), Callophisma fuscoluteum Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XIX. (1869) p. 634 non Dicks., Fasc. pl. crypt. II. (1790) p. 18, quae est Lopadium, Lecanora fulvolutea Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 146 und in Flora XLV. (1862) p. 82. — Arn. Nr. 194.

L Hinter der Aggensteinhütte bei Vils (Britzelm. 3 p. 102).

I Waldrast: selten über abgedorrtten Gräsern auf Erde des Blaser (Arn. 4 XI. p. 497); Brenner: hie und da über abgedorrtten Pflanzresten ober der Baumregion, auch noch längs der Bergschneiden (Arn. 4 XIII. p. 257).

U Zillerthal: Gerlosstein auf krystallinischem Kalk (Arn. 4 XXIV. p. 260).

B Gröden: Sellajoch am Fusse der Fünffingerspitze (Arn. 4 XXVIII. p. 113); Schlern: nicht häufig über abgestorbenen Gräsern auf steinigem Boden im oberen Damers (Arn. 4 IV. p. 634).

F Paneveggi: Vineghi über Kalk auf Phanerogamen und Moosen (Arn. 4 XXIII. p. 137).

Die Angaben über Lecidea fuscolutea: Tirol (Mohl b. Schaer. 1 p. 147) und: Zillerthal (Floerke 5 III. p. 304; 7 p. 32, siehe Arn. 4 XXIV. p. 253) können ohne Einsicht der Originale nicht gedeutet werden.