

- D** Tauern: Rottenkogel auf Erdboden (Arn. 4 XVIII. p. 256).
- B** Gröden: Sellajoch (Arn. 4 XXVIII. p. 113); Schlern: veraltete Festuca-Polster überziehend, auf Felsboden im oberen Damers (Arn. 4 IV. p. 634 Nr. 29 als *R. turfacea*: XIV. p. 474).
- F** Paneveggio: Monte Viésena, Kalk 2400 m, über veralteten Pflanzenresten auf steinigem Boden, mit *Blastenia leucorrhæa* Ach. über Pflanzenresten auf einem Kalkhügel gegen Vineghie, ober Giuribrutt auf Moosen resp. Gräsern, Vineghie, Kalk, ebenso, Rolle, Sandstein und Mergelkalk auf Erdboden und Moosen, Cavallazzo-See 2500 m auf *Sedum rhodiola* (Arn. 4 XXIII. p. 132, 134, 116, 137, 126, 148).
- G** Pinzolo: Mandron, über Moosen (Kst. 4 I. p. 337).
2. (261.) **Rh. Hookeri** (Sm.) nob., Lichen *Hookeri* Sm. in Engl. Bot. XXXII. (1811) tab. 2283, *Parmelia Hookeri* Fr., Lich. eur. (1831) p. 94, Schaer., Enum. (1850) p. 54, *Lecanora Hookeri* Rbh., Deutschl. Krypt. Fl. II. 1. (1845) p. 44, non *Dacampia Hookeri* Borr., Engl. Bot. Suppl. tab. 2622 (als *Verrucaria*). Siehe Kbr., Syst. (1855) p. 326.
- „Mir bekannt aus einem in Tirol gesammelten und von Hrn. v. Krempelhuber mitgetheilten Proëchen; scheint mit *Rinodina mniaroea* offenbar verwandt“ (Kbr. 1 p. 127).
- K** Kleiner Rettenstein: Geisstein auf Erde und Moosen 2270—2600 m (Saut. 21 p. 411).
3. (262.) **Rh. mniaroeiza** (Nyl.) Th. Fr., Lich. scand. p. 195 (1871), *Lecanora mniaroeiza* Nyl. in Flora LIII. (1870) p. 33. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIV. (1874) p. 269 und XXXVII. (1887) p. 132. — Arn. Nr. 223.
- I** Ueber veralteten Moosen auf Kalkblöcken bei den Obernberger Seen (Arn. 4 XIII. p. 269; im Verzeichnisse XXI. p. 124 steht in Folge Druckfehlers: VIII. p. 269, siehe Arn. 4 XXX. p. 367).
- B** Gröden: auf Erdboden bei der Ladiniabütte (Arn. 4 XXX. p. 222), Sellajoch am Fusse der Fünffingerspitze auf Dolomithboden (Arn. 4 XXVIII. p. 113).
- F** Paneveggio: Monte Viésena, Kalk 2400 m über veralteten Pflanzenresten auf steinigem Boden (Arn. 4 XXIII. p. 132; b. Zwackh 1 Nr. 914).
4. (263.) **Rh. turfacea** (Wahlenb.) Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 226, Lichen *turfaceus* Wahlenb., Fl. lapp. (1812) p. 408. — Arn. Nr. 224.
- V** Scesaplana (Theobald 1 p. 156).
- L** Grenzkamm: Obermädelejoch (Rehm b. Kbr. 3 p. 72; Kph. 4 p. 156), vordere Schrofen bei der Mädelegabel 2240 m am Boden: Sendtner; Wetterstein (Kph. 4 p. 156).
- O** Gurgl: die typische Form scheint selten zu sein, nur auf der Hohen Mut gefunden (Arn. 4 XV. p. 372).
- I** Auf dem Karwendel (Kph. 4 p. 156); Brenner: nicht häufig über abgedorrtten Moosen, alternder *Saxifraga bryoides* ober der Baumregion bis zu den Bergschneiden (Arn. 4 XIII. p. 257).
- K** Kleiner Rettenstein: bei 1300 m mit *Rh. sophodes* (Saut. 21 p. 408), nicht häufig auf Erde des Gipfels (Arn. 4 X. p. 103).
- D** Tauern: Möserlingwand auf Erdboden, Moosen hie und da (Arn. 4 XVIII. p. 270).