Apothecien auf Dryasblättern ober der Matreier Grube (Arn. 4 XI. p. 503 als f. nuda: XXI. p. 124).

U Vorderes Sonnwendjoch: am Erdboden des Gipfels über Moosen, Distichium capillaceum, Bryum pendulum (Arn. 4 XII. p. 532 als f. nuda: XXI. p. 124).

6. (265.) **Rh. archaea** (Ach.), Parmelia sophodes γ archaea Ach., Meth. (1803) p. 156. Lecanora (Rinodina) sophodes γ archaea Ach., Lich. univ. (1810) p. 357. Siehe Th. Fr., Lich. scand. p. 197 (1871) und Arn. in Flora LXIV. (1881) p. 195. — Arn. Nr. 916.

O Stanzerthal: auf dem Hirnschnitte eines abgesägten Fichtenstammes am Waldsaume zwischen Pettneu und St. Jakob, dann selten an Einfassungsstangen des Wiesenweges von Pettneu nach Schnann (Arn. 4 XXV. p. 393, 400, 401).

b) **minuta** Anzi, Lich. longob. exs. (1861—1868) Nr. 460. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 116, 133, 137.

F Paneveggio: auf Festuca-Resten am Nordabhange ober dem linken Bocche-See im Porphyrgebiete, Vineghie, Kalk, über veralteten Grasresten, Cavallazzo-See in vereinzelten Apothecien auf Rhodiola-Rhizomen bei 2500 m (Arn. 4 XXIII. p. 116, 137, 148).

7. (266.) **Rh. confragosa** (Ach.) Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 318, Parmelia confragosa Ach., Meth. (1803) Suppl. p. 33 non Kbr., Par. p. 73 (1859), Lecanora confragosa Nyl. in Flora LV. (1872) p. 247, Rinodina caesiella Kbr., Syst. (1855) p. 126, Par. p. 74 (1859), non Lecanora caesiella Floerke in Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) p. 97. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVI. (1896) p. 107. — Arn. Nr. 225.

(Ueber die Unterschiede von Rh. atrocinerea siehe Kst. in Progr. Unterrealsch. Bozen 1882 p. 17 und in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. (1892) p. 338).

O Paznaun: auf Glimmerschieferblöcken links von der Strasse unterhalb Galtür (Arn. 4 XXVII. p. 107).

B Jenesien: auf Porphyr am Krummenbühel (Kst. 4 V. p. 338 als R. caesiella Kbr.); an Augitporphyrblöcken des Trümmergerölles bei Seis (Arn. 4 IV. p. 609); Bozen: nicht häufig oberhalb Gries, auch an alten Schlossmauern zu Bozen von Heufler gesammelt (Arn. 4 VIII. p. 289 Nr. 17 und darnach bei Kst. 2 p. 17 Nr. 89 als R. atrocinerea Dicks.; Arn. 4 XXI. p. 124 Nr. 225 als R. atrocinerea (Dicks.) = R. caesiella Kbr.; wird hier eingefügt, weil nach dem Verzeichnisse XXX. die bezügliche Nummer ganz der R. confragosa entspricht), Fagenschlucht bei Gries; Castell Feder bei Auer (Kst. 2 p. 17 Nr. 91 als R. caesiella Kbr.).

8. (267.) **Rh. atrocinerea** (Dicks.) Kbr., Par. p. 73 (1859), Lichen atrocinereus Dicks., Fasc. pl. crypt. I. (1785) p. 14, tab. 9 fig. 2, Lecanora (Rinodina) anomala δ cooperta Ach., Lich. univ. (1810) p. 382, Lecanora cooperta Ach., Syn. (1814) p. 339.

B Bozen: auf Porphyr ziemlich häufig: Fagenschlucht, Sigmundskron, Calvarienberg, Kühbach (Kst. 2 p. 17), auf Porphyrmauern um Bozen (Kst. 4 II. p. 343).