

21. (280.) **Rh. maculiformis** (Hepp) Kbr., Par. p. 70 (1859), *Psora exigua* β *maculiformis* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 79 (1853), *Rinodina metabolica* ζ *maculiformis* Kbr. I. c. p. 70, *R. exigua* f. *maculiformis* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. (1871) p. 1143.

**O** Kühetai: auf dem harten Holze alter Zirbenstrünke: eine annähernde Form (Arn. 4 XIV. p. 467).

**I** Waldrast: an den Bretterplanken des Brunnens verbreitet (Arn. 4 VI. p. 1143), hie und da auf dem Holze alter Baumstumpfen am Abhange unter den Serleswänden (Arn. 4 XIV. p. 483).

**P** Ehrenburg: vereinzelt auf Holz (Kst. 4 VII. p. 292).

**B** Jenesien: an einem Zaune aus Fichtenholz bei der Marienkapelle, an Lärchenpfosten einer Hütte auf dem Salten (Kst. 4 III. p. 719), an Zaunholz (Kst. 4 VI. p. 224).

**G** Pinzolo: an Bretterplanken (Kst. 4 I. p. 332).

22. (281.) **Rh. Conradi** Kbr., Syst. (1855) p. 123, Par. p. 72 (1859); siehe Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 320 und Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 133, *R. Trevisanii* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 125, non *Psora Trevisanii* Hepp. — Arn. Nr. 233.

**I** Waldrast: ziemlich selten an entrindeten Fichtenstrünken der Ochsenalm (Arn. 4 VI. p. 1143, XI. p. 517 als *R. Trevisanii*: XXX. p. 368).

**B** Gröden: über veraltetem Moose auf der Erde einer Feldmauer bei St. Ulrich (Zopf b. Arn. 4 XXVIII. p. 122).

23. (282.) **Rh. Trevisanii** (Hepp) Kbr., Par. p. 70 (1859), *Psora Trevisanii* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 80 (1853).

**K** Am Geschoss bei Kitzbühel (Zwackh b. Kbr. 3 p. 71).

**B** Auf Planken im hinteren Eggenthal (Kst. 4 II. p. 342).

24. (283.) **Rh. pyrina** (Ach.) Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 229 p. p., *Lichen pyrinus* Ach., Prodr. (1798) p. 52, *Parmelia sophodes* var. *pyrina* Ach., Meth. (1803) p. 156, *Lecanora sophodes* var. *pyrina* Ach., Lich. univ. (1810) p. 357, *Rinodina exigua* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 125 non Ach. Siehe Arn. in Flora LXIV. (1881) p. 196, LXVII. (1884) p. 321. — Arn. Nr. 234.

**L** Plansee: an *Sorbus aria*, *Berberis*, *Salix purpurea* (Arn. 4 XXIX. p. 125, 126).

**O** Stanzerthal: Almejurjoch auf *Salix retusa*, St. Anton an Rhododendron, Pettneu an *Berberis*, Malfonthal an Rhododendron und einem hölzernen Brunnentroge (Arn. 4 XXV. p. 400, 399, 396, 397, 401), an einem später entfernten Brückengeländer bei St. Anton (Arn. 4 XXIX. p. 141); Mittelberg: ziemlich selten an Rhododendronzweigen (Arn. 4 XVII. p. 543); Gurgl: an Rhododendronzweigen (Arn. 4 XV. p. 377).

**I** Seefeld: an Bretterplanken (Arn. 4 XIV. p. 473); Waldrast: an dünnen Lärchenästen (Arn. 4 VI. p. 1138), selten an *Daphne mezereum*, häufig an *Sorbus chamaemespilus* (Arn. 4 VI. p. 1141, XI. p. 506), an *Vaccinium uliginosum* ziemlich selten, nicht häufig an *Mugus*-zweigen am Blaser, an Larixzweigen unter den Serleswänden (Arn. 4