

M Sulden (Fleischer b. Ch. Fr. Hochstetter 1 p. 86; siehe Schaer. 1 p. 65); an der Unterfläche und an versteckten Stellen der Glimmerschieferfelsen am Fusse des Schöneckberges (Arn. 4 XXII. p. 66).

D Tauern: Möserlingwand an der Unterfläche der Felsen, doch nirgends in grösserer Menge (Arn. 4 XVIII. p. 272), Gipfel des Grosseckner 3798 m (A. & H. Schlagintweit 1 p. 595).

2. (297.) *A. flava* (Bellardi) Stein, Flechten in Cohn, Cryptog.-Fl. von Schlesien II. 2. (1879) p. 110, Lichen flavus Bellardi in Mem. Accad. Torino 1792 p. 2, vergl. Usteri, Ann. d. Bot. XV. (1795) p. 90, Lecanora oxytona Ach., Lich. univ. (1810) p. 436, *L. flava* α oxytona Schaer., Enum. (1850) p. 65, Pleopsidium flavum Kbr., Syst. (1855) p. 114, Par. p. 51 (1859) excl. b. Kern., Schedae ad. fl. exsicc. austrohung. V. (1888) p. 104, Pleopsidium chlorophanum f. oxytonum Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. (1878) p. 286.

O Paznaun: an Glimmerschieferfelsen bei der Jamthalhütte (Arn. 4 XXVII. p. 109; Zopf 2 Bd. 284 p. 117 als *P. chlorophanum*); Gurgl: ziemlich selten an der senkrechten Schattenseite der Blöcke im gegenüberliegenden Gerölle (Arn. 4 XIX. p. 286).

I Glungezer (Pkt. 7 p. 143 als *Lecidea chlorophana*), Morgenkofel, Neunerspitze, Glungezer, Viggard beim „g'schriebenen Stein“, Kreuzjoch, Arzthal (Pkt. Hb. F. als *Parmelia chlorophana*; siehe DT. 10 p. 267), Morgenkopf, Haneburger etc. (Leithe 2 p. 42).

3. (298.) *A. Heufleriana* Kbr., Par. p. 57 (1859), *Lecanora hilaris* Duf. b. Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 173, *A. hilaris* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXV. (1875) p. 484, XLVII. (1897) p. 367. Siehe auch Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) p. 63. — Arn. Nr. 213.

B Bozen: nicht selten oberhalb Gries (Arn. 4 VII. p. 290, Exs. Nr. 434^b), an den Porphyrfelsen bei Hörtenberg, von Heufler entdeckt (Hfl. b. Kbr. 3 p. 57; Arn. 4 VIII. p. 290, Exs. Nr. 434^a; Sarnth. Hb. F.).

b) *sulphurata* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. (1872) p. 290, *A. Heufleriana* f. *hilaris* Arn. ibid. XXVI. (1876) p. 124, *A. sulphurata* Arn. ibid. XXXVI. (1886) p. 63, *A. hilaris* f. *sulphurata* Arn. ibid. XLVII. (1897) p. 367.

M Schlanders: in den Schmittknötten von Prof. Dr. Steiner gefunden (Arn. 4 XXIII. p. 62), zerstreut auf grösseren Glimmerschieferblöcken am Ausgange des Schlandernaunthales (Arn. 4 XXII. p. 63, XXIV. p. 266, Exs. Nr. 885; b. Zwackh 1 Nr. 973^a).

B Bozen: selten an Porphyrböcken ober Gries (Arn. 4 VIII. p. 290, XXIV. p. 261; Eggerth b. Zwackh 1 Nr. 793^b).

4. (299.) *A. glaucocarpa* (Wahlenb.) Kbr., Par. p. 57 (1859), Lichen glaucocarpus Wahlenb. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. (1806) p. 143, tab. 4 fig. 4, Fl. suec. II. (1826) p. 848, *Lecanora glaucocarpa* Ach., Lich. univ. (1810) p. 410, *Lecanora cervina* α *glaucocarpa* Smft., Suppl. fl. lapp. (1826) p. 106, *Parmelia cervina* α *glaucocarpa* Fr., Lich. eur. (1831) p. 127, *Myriospora glaucocarpa* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 377 (1857). — Arn. Nr. 214.

L Grenzkamm: Kratzer; Aggenstein bei Vils (Britzelm. 3 p. 101).