

**M** Meran: auf dem Mörtel im Innern des Thurmes der Ruine Brunnenburg 590 m (Arn. 4 XXII. p. 61).

**E** Lüsen: am Joche gegen Afers auf Dolomit (Sarath. b. Kst. 6 p. 302, Hb. F.).

**D** Gipfel des Grossglockner 3798 m, auf Chloritschiefer dürftig, nur einzelne zerstreute, fast sterile Thallusschüppchen: „*Zeora cervina* Pers. var. *squamulosa* Schrad.“ (A. & H. Schlagintweit 1 p. 595, b. Kph. 4 p. 172).

**B** Schlern: an Dolomittfelsen bei Salegg, eine Form mit theilweise schwach bereiften Apothecien an Dolomit im oberen Damers und an Kalkblöcken beim Heubade, auf Dolomit ober der Seiseralpe (Arn. 4 IV. p. 640).

b) *leucospora* Mass., Sched. crit. (1856) p. 156, *A. cervina* c. *leucospora* Jatta, Syll. Lich. ital. (1900) p. 233, *A. cervina*  $\gamma$  *pruinosa* Mass., Ric. (1852) p. 28.

**R** Monte Baldo, an Jura-Felsen (Jatta 1 p. 233).

7. (302.) *A. veronensis* Mass., Ric. (1852) p. 29, Exs. Nr. 64 (1853). Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XX. (1870) p. 528 und XXX. (1880) p. 124\*). — Arn. Nr. 216.

**O** Finsterthal: hie und da an Felsen von Kühetai bis zu den Seen (Arn. 4 XIV. p. 440).

**I** Auf Glimmerschiefersteinen unter Fichten oberhalb der Waldrast (Arn. 4 VI. p. 1106), Serlesgrube nicht häufig an den Kalkglimmerschieferblöcken bei 2270 m (Arn. 4 XI. p. 490); Brenner: an Gneissblöcken beim Kaserer im Vennathale (Arn. 4 XIII. p. 235).

**K** Auf Thon- und Grauwackenschiefer, rotem Sandstein und auf Granitblöcken bis in die Alpen: Ehrenbachalpe (Ung. 8 p. 252 als *Parmelia cervina*; ob hieher?); Grosser Reitenstein: auf Phyllit (Arn. 4 V. p. 528).

8. (303.) *A. fuscata* (Schrad.) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XIX. (1869) p. 279, Lichen fuscatus Schrad., Spicil. (1794) p. 83, *Parmelia fuscata* Ach., Meth. (1803) p. 189, *Lecanora cervina* subsp. *fuscata* Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 175, *L. fuscata* Nyl. in Notiser Sällsk. fauna et fl. fenn. Förh. VIII. (1866) 1882 p. 138 und in Flora LV. (1872) p. 364, *A. smaragdula* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) p. 707 ff. — Arn. Nr. 217.

**O** Stanzerthal: auf allen Silikatgesteinen bis zur Höhe des Kaiserjoches 2318 m (Arn. 4 XXV. p. 360, 361, 363, 364, 365, 366, 369, 376), auf überspülten Blöcken in der Rosannaschlucht bei St. Anton (Arn. 4 XXIX. p. 137); Imst: Altstarkenbergr auf der „Hohen Rast“ (Pkt. Hb. F. mit *Aspicilia cinerea*); Mittelberg: im Taschachthale (Arn. 4 XVII. p. 535); Umhausen: Mauersteine am Wege zum Wasserfalle und Felsblöcke bei demselben (Arn. 4 VII. p. 279, 281); Sölden: auf Brettern am Friedhofe, ziemlich selten: *f. lignicola* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 769 (1867) (Arn. 4 XIX. p. 292); Vent: am Gipfel der Kreuzspitze 3450 m, zerstreut zwischen anderen Flechten (Arn. 4 XIX. p. 294).

\*) Der Name ist dort mit einem Fragezeichen versehen: „da man nicht sicher weiss, welche Flechte Massolongo so benannt hat“ (Arn. in litt. 8. Juni 1896).