

- I** Innsbruck: auf Felsen am Goldbühel im Iglerswald (Pkt. Hb. F. mit *Dimelaena Mougeotoides*); an Glimmerschieferblöcken unterhalb der Waldrast (Arn. 4 VI. p. 1106).
- U** Kufstein: Kaiserthal auf rotem Sandstein (Arn. 4 I. p. 707); Zillertal: Finkenberg gegen Brunnhaus auf Phyllit (Arn. 4 XXIV. p. 254).
- K** Kleiner Rettenstein: Phyllit, nicht selten an Felsen und Blöcken (Arn. 4 X. p. 94).
- M** Schlanders: auf Glimmerschieferblöcken am Ausgange des Schlandernaunthales (Arn. 4 XXII. p. 63).
- E** Häufig auf verschiedenem Gestein (Kst. 6 p. 302).
- P** Ehrenburg: auf Thonschiefer häufig, auf Gneiss bei Kiens (Kst. 4 VII. p. 282, 286); Buchenstein oder Predazzo (Molendo b. Arn. 2 p. 460).
- D** Tauern: Proseck auf Chloritschiefer (Arn. 4 XVIII. p. 253).
- B** Sarntal: Möltneralpen auf Sandstein und Porphy (Kst. 4 VI. p. 195); Jenesien: auf Porphy, Sandstein, Gneiss, Glimmerschiefer (Kst. 4 III. p. 705, 713, V. p. 333, 336, 338, VI. p. 218, 220); Gröden: auf Porphy bei Innerpontifes (Arn. 4 XXVIII. p. 121); Schlerengebiet: auf dem Augitporphy-Trümmergerölle bei Seis, auf Spilit im Damers (Arn. 4 IV. p. 609, 617); Bozen: mit *A. glaucocarpa*, noch häufiger als diese (Kst. 2 p. 15), nicht selten an Blöcken ober Gries und Hörtenberg, nach Heuffer an alten Schlossemauern zu Bozen (Arn. 4 VIII. p. 289), auf Porphy ober Signal (Kst. 4 II. p. 342), Calvarienberg, Kühbach, Sigmundskron (Kst. 2 p. 15); Eislöcher, nicht selten (Hb. Hb. F. mit *Aspicilia cinerea*; Arn. 4 VIII. p. 297).
- F** Fassa: am Aufstiege zum Sasso dei Mugoni, dürrig auf Hornstein (Arn. 4 XX. p. 362); Predazzo: siehe **P**, auf Melaphyr am Saccinabache (Arn. 4 XXIII. p. 93), Mulatto auf Turmalingranit und Uralitporphy nicht besonders ausgebildet (Arn. 4 XX. p. 354), dürrig auf der Oberfläche der Syenitblöcke im Bachbette des Travnigolo am Fusse der Margola (Arn. 4 XX. p. 356); Paneveggio: auf Quarzporphy in Gebiete des Rollepases nicht häufig und dürrig (Arn. 4 XX. p. 372), daselbst auf Sandstein und Mergelkalk (Arn. 4 XXIII. p. 120).
- G** Pinzolo auf Tonalit: Maudron, Corno alto, S. Stefano und Carisolo, Pinzolo auf Thonschiefer (Kst. 4 I. p. 334, 319, 321, 323).
- b) var. *discreta* (Ach.)?, vergl. *Parmelia squamulosa* γ *discreta* Ach., Meth. (1803) Suppl. p. 41, *Lecanora badia* § *discreta* Ach., Lich. univ. (1810) p. 407, *A. discreta* Th. Fr., Lich. Scand. p. 217 (1871).
- O** Gurgl: auf Glimmerschieferblöcken am Wege zum Gaisberggletscher (Arn. 4 XV. p. 357 Nr. 37, XXI. p. 124).
- D** Tauern: nicht häufig auf Blöcken am Wege unweit von Auserschlöss (Arn. 4 XVIII. p. 267 Nr. 13 als *A. discreta*: XXI. p. 124).
9. (304.) *A. sinopica* (Wahlenb.) Kbr., Syst. (1855) p. 156, Par. p. 57 (1859), *Endocarpon sinopicum* Wahlenb. in Ach., Meth. (1803) Suppl. p. 30, Fl. lapp. (1812) p. 460, *Lecanora sinopica* Smft., Suppl. fl. lapp. (1826) p. 102, *Acarospora fuscata* f. *sinopica* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXI. (1871) p. 1106. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. (1893) p. 361.
- O** Stanzerthal: auf Glimmerschiefer bei St. Christoph, auf Schiefergestein zwischen Strengen und Pians (Arn. 4 XXV. p. 381, 361);