

klamm (Arn. 4 IV. p. 633); Bozen: nicht häufig an niedrigen Porphyrwänden oberhalb Gries, c. ap. (Arn. 4 X. p. 111); Eppan: an Kalkfelsen gegen Perdonig (Hb. b. DT. 10 p. 268, Hb. F.).

F Fassa: an einem Kalkblocke bei Vigo (Arn. 4 XX. p. 361); Paneveggio: steril auf Erde der Felsritzen am Monte Castellazzo (Arn. 4 XXI. p. 112).

G Bei Tione, Preore und Cavrasto, überall auf Kalk (Sarnth.).

T Charakteristische Flechte auf humosen Kalkfelsen: Terlagosee auf Kalkerde (Kst. 4 V. p. 328); Calavino (Strasser), bei Ravina und Mattarello (Sarnth., det. Arn.).

R Marocche bei Dró auf Erdboden (Kst. 4 VII. p. 309); Riva: Ponale, nicht häufig und nur steril (Arn. 4 IX. p. 309), Doss Brione (Strasser), Mori (Arn. 4 XXIX. p. 130); Rovereto: an Felsen im Gebiete des Colsanto (Crist. 1 p. 333, 347, Hb. F.; b. DT. 10 p. 268). Siehe auch *P. lentigerum*.

h) *dealbatum* Mass., Sched. crit. (1856) p. 59; siehe Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 313.

I Brenner: am Bachufer links vom Wege im Vennathale an einer aus krystallinischem Kalk und Gneiss zusammengesetzten Felsmasse c. ap. (Arn. 4 XIV. p. 495).

B Häufig an Dolomittfelsen um Seis, Ratzes, der Seiseralpe: Milde, auch bei Seis in grossen Exemplaren von Hausmann beobachtet (Arn. 4 IV. p. 639; wird jedoch bei Milde 29 nicht erwähnt); Eppan: auf Moosen am Kreuzberge bei St. Pauls (Kst. 4 II. p. 341).

T Andalo, Terlagosee auf Erdboden (Kst. 4 V. p. 328).

R Am Abhänge oberhalb Torbole auf Erdboden (Kst. 4 VII. p. 309).

Zu dieser Art dürfte gehören:

Lecidea baldensis Sprengel, Pugill. II. (1815) p. 95, Poll. in Giorn. phys.-med. IX. (1816) Sep. p. 28: „Crusta imbricata foliaceo-lobata pallide virescente subtus alba fusciscentis, lobis minutis crenatis; apotheciis confertis planis incarnatis demum marginatis“. Lichen pulmonarius saxatilis farinaceus foliis brevioribus, inferne albis, desuper e cinereo virescentibus, receptaculis florum rufis. Mich. Gen. p. 94 ord. XXX. Nr. 2, tab. 51 fig. 2?*, Seguier Fl. veron. III. p. 49.

R Monte Baldo: im Gebiete von Brentonico (Poll. 1 p. 109); „oritur inter saxa montis Baldi aliorumque montium humiliorum et collium Veronensium et Tridentinorum“ (Poll. 3 III. p. 437).

14. (321.) *P. lentigerum* (Weber) Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 181, Lichen lentigerus Weber, Spicil. (1778) p. 192, Parmelia lentigera Ach., Meth. (1803) p. 192, Lecanora lentigera Ach., Lich. univ. (1810) p. 423, Th. Fr., Lich. scand. p. 220 (1871), Lecanora (Placodium) lentigerum. Zahlbr. in Ann. naturhist. Hofmus. Wien XI. (1896) p. 94, Psoroma lentigerum Kbr., Syst. (1855) p. 119.

? In collibus et montibus Tridentinis frequens (Poll. 3 III. p. 436 und darnach Rbh. 2 II. 1 p. 44 — gehört gewiss zu *P. crassum*).

T Zwischen Trient und Vezzano auf Kalkhumus (Strasser).

*) Diese Phrase wird von Krempelhuber, Gesch. u. Litt. Lich. II. (1869) p. 512 auf *Psora testacea* bezogen.