

sein, stimmt aber in den inneren Merkmalen auffallend mit dem Exemplare in Lojka Exs. Nr. 155* (Kst. 4 VI. p. 196).

11. (336.) *L. atriseda* (Fr.) Nyl., Lich. Scand. (1861) p. 170, *Parmelia badia* γ *atriseda* Fr., Nov. sched. crit. (1827) p. 6, Lich. eur. (1831) p. 149, *Lecanora cupreobadia* Nyl. in Nya Bot. Notiser 1853 p. 165. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXV. (1875) p. 439, XXVI. (1876) p. 356 und XXXVII. (1887) p. 111. — Arn. Nr. 251.

O Mittelberg: hie und da beim Mittagkögele (Arn. 4 XVII. p. 535); Kühetai: an Gneissfelsen der Schneide des Abhanges links ober dem Finsterthaler See bei 2600 m (Arn. 4 XIV. p. 439); Vent: Ramoljoch steril (Arn. 4 XV. p. 362); Gurgl: Glimmerschieferwände am Wege zum Eisse (Arn. 4 XV. p. 356).

B Gröden: auf Porphyrböcken beim Kalten Eck oberhalb Unterkofel bei St. Ulrich (Arn. 1 Nr. 1788).

F Fassa: Monzoni an krystallinischem, mit Silikaten imprägniertem Kalk (Arn. 4 XX. p. 366); Predazzo: an Porphyrböcken der Jochhöhe zwischen Val Maor und Caoria (Arn. 4 XXIII. p. 111).

12. (337.) *L. pallida* (Schreb.) Schaer., Enum. (1850) p. 78, Lichen pallidus Schreb., Spicil. fl. lips. (1771) p. 133, *L. albellus* Pers. in Usteri Ann. d. Bot. XI. (1795) p. 18, *Parmelia albella* Ach., Meth. (1803) p. 163, *L. albella* Ach., Lich. univ. (1810) p. 369, *L. pallida* α *albella*, Schaer., l. c. p. 78, Kbr., Syst. (1855) p. 114, Par. p. 81 (1859). Siehe Arn. in Flora LIV. (1871) p. 193. — Arn. Nr. 252.

L Plansee: an Buchen, Ahorn, Weiden, *Pinus pumilio* (Arn. 4 XXIX. p. 123, 124, 127).

I Inzing: an Lärchen (Arn. 4 III. p. 952); Innsbruck: Sonnenburgerhügel mit *L. subfusca* (Hf. Hb. F.), Iglerwald an Erlenrinde (Pkt. Hb. F. als *L. subfusca* p. *albella*; siehe DT. 10 p. 272); Brenner: Vennathal, an *Alnus viridis*, kärglich ausgebildet (Arn. 4 XIII. p. 276), auf Lärchen am Eingange des Thales (Arn. 4 XXIX. p. 131, Exs. Nr. 1625^b; siehe XXX. p. 369).

U Brandenburg: an Buchen und jüngeren Tannen (Arn. 4 XXX. p. 210).

K Auf Ahornstämmen (Ung. 8 p. 251).

P Ehrenburg: auf *Prunus padus* (Kst. 4 VII. p. 296).

B Jenesien: an *Pinus abies*, *P. picea*, *Fagus* (Kst. 4 III. p. 721, 722, 726, V. p. 340); Wolfsgruben am Ritten (Hsm. Hb. F.); Schlerengebiet: an *Alnus incana* in Ratzes (Milde 29 p. 20; b. Arn. 4 IV. p. 623); an Tannennrinde zwischen Ratzes und Hauenstein (Arn. 4 IV. p. 623); die auf *Larix* angegebene Pflanze ist *L. angulosa*: XIV. p. 474); Bozen: auf glatter Rinde von Laubböhlzern ziemlich häufig: an Pappeln (Hsm. Hb. F.; b. Kst. 2 p. 18), auf *Ostrya* und *Quercus* in Haslach, auf jungen Kastanien am Wege zum Stallerhof (Kst. l. c.); Salurn, an *Morus* (Kst. 4 VI. p. 213).

F Predazzo: nicht selten an glatter Rinde der Tannennstämme im Walde gegen den Monte Paradiso (Arn. 4 XXI. p. 108); Paneveggio: an *Alnus incana* (Arn. 4 XXIII. p. 146).

T Lavarone, an *Fagus* (Kst. 4 VI. p. 215).

R San Sebastiano bei Folgaria an *Fagus* (Kst. 4 VI. p. 215); San Martino bei Arco, Castell Penedal bei Nago auf *Olea* (Kst. 4 VII. p. 310); Monte Baldo: Vall' Artalone 1300—1500 m (Poll. 1 p. 112).