

**E** Mareit: auf Schiefergestein der Wegmauern hinter Schloss Wolfsturn (Sarnth. b. Kst. 6 p. 302, Hb. F.).

**P** Ehrenburg: auf Thonschiefer der Steinmauer am Marbacher Sattel (Kst. 4 VII. p. 280, 283).

**B** Gröden: bei Wolkenstein eine Porphyrrand jenseits des Baches überziehend (Arn. 4 XXX. p. 219); Ueberetsch: nicht häufig an den Felsen der Eislöcher (Arn. 4 VIII. p. 296, X.?, siehe XXI. p. 126).

**T** „In agro Tridentino“ (Jatta 1 p. 207).

17. (342.) **L. subradiosa** Nyl. in Flora LVII. (1872) p. 549. — Arn. Nr. 256.

**D** Tauern: Proseck auf Chloritschiefer, steril, nicht häufig (Arn. 4 XVIII. p. 252).

**B** Gröden: auf Porphyr bei Innerpontifes (Arn. 4 XXVIII. p. 121) und Wolkenstein (Arn. 4 XXX. p. 219); Ueberetsch: an der Unterflache beschatteter Felsen in den Eislöchern, steril (Arn. 4 VIII. p. 297 Nr. 60 als *Diploicia* —, XXI. p. 131 Nr. 350 als *Diploicia canescens* (Dicks.) Mass. = *Lichen canescens* Dicks.: XXX. p. 369); selten an Porphyrfelsen bei den Eislöchern (Arn. 4 X. p. 114 Nr. 17 als *Pertusaria sulphurea*: XXI. p. 126, welche letztere Berichtigung von Kst. 2 p. 29 nicht beachtet wurde).

**F** Predazzo: an Syenitwänden an der Ostseite der Sforzella, steril (Arn. 4 XX. p. 352), auf Syenit am Fusse der Margola steril, mit *Karschia saxatilis* (Arn. 4 XXIII. p. 84; b. Zwackh 1 Nr. 580); Paneveggio: steril an einer Porphyrrand in der Travignoloschlucht (Arn. 4 XXIII. p. 97, Exs. Nr. 1109).

18. (343.) **L. albescens** (Hoffm.) Th. Fr., Lich. scand. p. 252 (1871), *Psora albescens* Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 165, *Lichen albescens* Ach., Prodr. (1798) p. 105, *Placodium albescens* Kbr., Par. p. 53 (1859), Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 186, *Parmelia galactina* Ach., Meth. (1798) p. 190, *Lecanora galactina* Ach., Lich. univ. (1810) p. 424, Kbr., Syst. (1855) p. 145, *L. saxicola* d. galactina Fr., Lich. eur. (1834) p. 111. — Arn. Nr. 922.

**O** Stanzerthal: auf einem alten Knochen im Sandsteingerölle zwischen St. Jacob und Pettneu (Arn. 4 XXV. p. 401).

**K** Kitzbühel: am Jufen (Ung. 8 p. 252); Geisstein: auf Thonschiefer (Saut. 21 p. 411; Zwackh).

**P** Buchenstein oder Predazzo (Molendo b. Arn. 2 p. 460).

**F** Siehe **P**; Paneveggio: auf dem Sandstein der Seiser- und Campiller Schichten bei der Felsmulde auf der Höhe ober dem Rollepasse (Arn. 4 XXX. p. 369).

? **R** Monte Baldo: an Kalkfelsen, besonders alla Corona (Poll. 3 III. p. 439).

19. (344.) **L. frustulosa** (Dicks.) Ach., Lich. univ. (1810) p. 405, Syn. (1814) p. 159, *Lichen frustulosus* Dicks., Fasc. pl. crypt. III. (1793) p. 13, Ach., Prodr. (1798) p. 76, *Parmelia frustulosa* Ach., Meth. (1803) p. 172, *Lecanora frustulosa*  $\alpha$  *argopholis* Kbr., Syst. (1855) p. 139, Par. p. 86 (1859). Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 91. — Arn. Nr. 923.

**O** Silz: auf Phyllit selten (Arn. 4 XXII. p. 77).

**E** Franzensfeste, auf Graniterde (Sarnth. b. Kst. 6 p. 303, Hb. F.).