

b) *albicans* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 98, Exs. Nr. 1167.

O Arlberg: auf überspülten Glimmerschieferblöcken in der Rosannaschlucht bei St. Anton, nicht selten und durch den weissen Thallus auffallend (Arn. 4 XXIX. p. 137, 138, Exs. Nr. 1618).

F Predazzo: Porphy, an Blöcken und grösseren Steinen im Bache gegen Val Maor (Arn. 4 XXIII. p. 98); Paneveggio: ebenso längs des Baches unterhalb der Alpe vor dem Rollepasse (Arn. 4 XXIII. p. 98, Exs. Nr. 1167), auf grösseren Porphysteinen im Bache unterhalb der Alpe vor Rolle (Arn. 4 XXIII. p. 117).

7. (379.) *A. polychroma* Anzi, Catal. lich. sondr. (1860) p. 59, f. candida Anzi l. c. p. 59, Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 121; siehe Nyl. in Flora LXIV. (1881) p. 183. — Arn. Nr. 929.

O Stanzenthal: Kaiserjoch 2318 m auf Kalk und einem kalkarmen Gestein (Arn. 4 XXV. p. 369, 372), Augsburgerhütte bei Pians auf Kalk (Arn. 4 XXVI. p. 102).

B Sarnthal: nördliches Kreuzjoch auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 196).

F Fassa: auf Steinen der Seiser- und Campiller Schichten am Westabhange der Rodella (Neugschwentner b. Arn. 1 Nr. 999^b); Predazzo: auf Augitporphyrbreccie links ober dem Satteljöchl 2200 m (Arn. 4 XXIII. p. 118); Paneveggio: auf Kalk und Sandstein der Seiser- und Campiller Schichten am Rollepasse, häufig an den Felsbänken und Platten (Arn. 4 XXIII. p. 121, Exs. Nr. 999^a; Lojka b. Kern. 78^a Nr. 2754, 78^b VII. p. 97).

8. (380.) *A. inornata* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. (1877) p. 550 und XXX. (1880) p. 128, Exs. Nr. 669, *A. subdepressa* var. *inornata* Arn. in Ber. bayer. bot. Ges. III. (1893) Lich. exs. p. 12. — Arn. Nr. 291.

O Gurgl: auf grösseren Glimmerschiefersteinen am Kühkomplexeck und längs der Gipfelschneide des Festkogel (Arn. 4 XX. p. 382).

I Rosskogel: auf Blöcken und grösseren Steinen längs des Baches unterhalb des Seeabflusses (Arn. 4 XVII. p. 550, XXII. p. 73, Exs. Nr. 669); Brenner: an Gneissblöcken längs der Gletscherbäche hie und da (Arn. 4 XVII. p. 567).

M Sulden: auf den Felsen ganz oben am hintern Grat, Glimmerschiefer 2700 m (Arn. 4 XXII. p. 68).

9. (381.) *A. supertegens* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. (1877) p. 567 und XXX. (1880) p. 128, Exs. Nr. 668, *A. laevata* nach Nyl. in Flora LXIV. (1881) p. 183, *A. laevata* Ach. f. *supertegens* Arn. in Ber. bayer. bot. Ges. III. (1893) Lich. exs. p. 12. — Arn. Nr. 292.

I Brenner: an einem Gneiss- oder Glimmerschieferblocke ober dem Wilden See am Wege zum Kraxentraggipfel (Arn. 4 XVII. p. 567, Exs. Nr. 668).

10. (382.) *A. caesiocinerea* (Nyl.) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) p. 67, *Lecanora caesiocinerea* Nyl. in Flora LV. (1872) p. 364. Siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 98. — Arn. Nr. 930.