

? **K** Kitzbühel: auf schieferiger Grauwacke bei Reicher (Ung. 8 p. 251 als *Parmelia cinerea* γ *protuberans* = *Urceolaria gibbosa* Ach. ex parte [vergl. Fr., Lich. eur. (1831) p. 144, Th. Fr., Lich. scand. p. 277 (1871)]).

E Ridnaun: auf Glimmerschiefer; Grasstein, hinterstes Lügen auf Thonschiefer (Sarnth. Hb. F., siehe Kst. 6 p. 303).

P Ehrenburg: auf Thonschiefer verbreitet (Kst. 4 VII. p. 283).

B Sarnthal: südliches Kreuzjoch auf Sandstein und Porphyry, östliche Kaserböden (Kst. 4 VI. p. 196); Jenesien: auf Porphyry, Sandstein, Granit (Kst. 4 III. p. 706, V. p. 334, 336, 338, VI. p. 218); Villnöss: gegen Afers und bei Bad Froi, auf Glimmerschiefer (Sarnth. Hb. F., siehe Kst. 6 p. 303); Bozen: auf Porphyry bei Runkelstein und ober Signat (Kst. 4 II. p. 344).

R Folgaria, auf Kalk (Hb. b. Kbr. 3 p. 97).

15. (387.) **A. verruculosa** Kph. in Denkschr. bot. Ges. Regensburg IV. 2. (1861) p. 283, *A. subdepressa* var. *verruculosa* Arn. in Ber. bayer. bot. Ges. III. (1893) Lich. exs. p. 8. Nach Nyl. in Flora LXIV. (1881) p. 183 und Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 371 synonym mit *A. subdepressa*. — Arn. Nr. 294.

K Kleiner Rettenstein: ziemlich selten an Phyllitfelsen des Gipfelmassivs (Arn. 4 X. p. 94).

B Gröden: auf Augitporphyrsteinen am Karrenwege von St. Ulrich gegen die Seiseralpe (Arn. 1 Nr. 1728); Schlern: auf Spilit im Damers (Arn. 4 IV. p. 618, Exs. Nr. 342^a, XXII. p. 74, wo infolge Druckfehlers p. 128 statt 618 steht).

F Fassa: Monzoni auf rothbraunem Diorit ziemlich selten (Arn. 4 XX. p. 367).

16. (388.) **A. cervinocuprea** Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVI. (1876) p. 357 und XLIII. (1893) p. 405, *A. olivacea* Baglietto f. *cervinocuprea* Arn. l. c. XXIX. (1879) p. 381.

O Kühelai: an der Felswand, in deren Nähe der steinige, flechtenreiche Abhang in der Richtung gegen die Plendele-Seen sich hinzieht (Arn. 4 XXV. p. 405); Gurgl: an Felswänden am Wege zum Ramoljoch bei 3000 m (Arn. 4 XV. p. 354, 357, XXV. p. 405), an Glimmerschieferwänden auf der Nordseite der Hohen Mut (Arn. 4 XX. p. 381, Exs. Nr. 754^{*}).

17. (389.) **A. conglomerans** (Nyl.) Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVI. (1896) p. 280, *Lecanora conglomerans* Nyl. in Flora LVI. (1873) p. 292.

P Auf Thonschiefer auf einem Hügel bei Ehrenburg (Kst. 4 VII. p. 280, 283).

18. (390.) **A. cinerea** (L.) Mass., Ric. (1852) p. 36, *Lichen cinereus* L. Mant. I. (1767) p. 132, *A. cinerea* α *vulgaris* Kbr., Syst. (1855) p. 164, Par. p. 97 (1860), *Parmelia cinerea* Fr., Lich. eur.

^{*} In Ber. bayer. bot. Ges. III. (1893) Lich. exs. p. 14 wird diese Nummer *A. cupreoastra* Nyl. genannt. Vergl. *Lecanora cupreoastra* Nyl. in Flora LXIX. (1866) p. 417.