

Rettenstein: weit verbreitet auf morschem Holze (Arn. 4 X. p. 106, XIV. p. 493).

M Sulden: auf Erde und Moos (Arn. 4 XXII. p. 67).

E Flaggenthal bei Franzensfeste; Valsertal (Pfaff).

P Ehrenburg: auf morschen Strünken (Kst. 4 VII. p. 292); Bruneck: auf morschen Strünken am Kronplatz (Leiter) und bei Bad Bergfall (Hoffm. b. DT. 10 p. 281); Schluderbach: auf faulem Zirbenholze, nahe am Boden (Arn. 4 XVI. p. 413).

D Innichen, Helm (Pfaff).

N Gampenjoch (Pfaff).

B Sarntal: nördliches Kreuzjoch, Kaserböden (Kst. 4 VI. p. 204); Salten (Pfaff); Ritten (Hsm. Hb. F.); Villnöss: bei Bad Froi (Sarntal. b. Kst. 6 p. 303, Hb. F.), Seis gegen Völs (Hsm. Hb. F.) auf faulem Holze in Ratzes (Milde 29 p. 19), auf faulen Fichtenstrünken im Walde bei Ratzes (Arn. 4 IV. p. 624), Schlernklamm, Seiseralpe; Eggenthal: Nigeralpe (Pfaff), Karrer-See (Kst. 4 VII. p. 216); Kollern, Weissenstein (Pfaff).

F Predazzo und Paneveggio: auf Porphyrrerboden innerhalb der Waldgrenze; Predazzo: Melaphyrrerboden auf der Höhe des Mulatto 2150 m, Syeniterdboden am Fusse der Margola; Paneveggio: über Sphagnum acutifolium (Arn. 4 XXIII. p. 108, 95, 89, 149); Primör, Lago di Calaita (Pfaff), San Martino auf Erde bei einem alten Kohlenmeiler (Bargagli 2 p. 164).

G Pinzolo: Corno alto an Baumstrünken über Moosen (Kst. 4 I. p. 338).

T Bei Trient (Jatta 1 p. 74).

R Rovereto: „sulla sessa in montagni in luoghi umidi“ (Crist. Hb. F.); Monte Baldo: Pian della Cenere (Mass. 2 p. 26).

15. Fam. Diploschistaceae (Urceolariaceae).

51. Diploschistes Norman.

(Urceolaria Ach. non Molina.)

1. (418.) **D. ocellatus** (Vill.) Norman in Magaz. f. Naturvidensk. VII. (1853) p. 232, Lichen ocellatus Vill., Hist. pl. Dauph. III. (1789) p. 988, Urceolaria ocellata DC. in Lam. et DC., Fl. franç. 3. éd. II. (1805) p. 572, Lichen vallesiacus Schleich., Pl. crypt. helv. II. (1805) Nr. 75. Siehe Arn. in Flora LXIV. (1881) p. 172. — Arn. Nr. 936.

R Auf Nummuliten-Kalkmergel bei Varone im Val Tenno unweit Arco von Ober-Bergdirector K. W. v. Gümbel aufgefunden (Arn. 4 XXX. p. 217).

2. (419.) **D. scruposus** (L.) Norman in Magaz. f. Naturvidensk. VII. (1853) p. 232, Lichen scruposus L., Mant. II. (1771) p. 131, Schreb., Spicil. fl. lips. (1771) p. 133, Parmelia scruposa Fr., Lich. eur. (1831) p. 190, Urceolaria scruposa Ach., Meth. (1803) p. 147, U. scruposa α vulgaris Kbr., Par. p. 104 (1860). — Arn. Nr. 328.

O Stanzerthal auf Schiefergestein: St. Anton, zwischen Strengen und Pians (Arn. 4 XXV. p. 376, 360, 361); Paznaun: unterhalb Galtür