

K Kleiner Rettenstein: nicht häufig an Phyllitwänden ober der Alpe (Arn. 4 X. p. 95).

D Tauern: Möslerlingwand an einer niedrigen Glimmerschieferwand (Arn. 4 XVIII. p. 270, Exs. Nr. 672).

B Schlerengebiet: sparsam an Angitporphyrblöcken längs des Heuweges, auch von Hausmann bei Seis beobachtet (Arn. 4 IV. p. 612).

F Predazzo: selten auf Erde an rissigen Stellen der Syenitwände an der Ostseite der Sforzella (Arn. 4 XX. p. 352); Paneveggio: Porphy auf Erde an Felsen ober dem Bocche-See, auf felsigem Boden ober Giuribrutt (Arn. 4 XXIII. p. 116).

2. (480.) *T. imbricata* (Montagne) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXII. (1872) p. 290, *Lecidea imbricata* Montagne in Ann. sc. nat. Bot. 2. sér. XVI. (1841) p. 125, *Biatora imbricata* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 735 (1867). — Arn. Nr. 360.

D Windischmatrei: an einigen grösseren Chloritschieferblöcken bei Proseck (Arn. 4 XVIII. p. 253, Exs. Nr. 671), ziemlich sparsam an sonnigen Felsen unter dem Schlosse Weissenstein (Arn. 4 XVIII. p. 253, 251).

B Bozen: ziemlich selten an den Porphyrfelsen bei Hörtenberg (Arn. 4 VIII. p. 290).

3. (481.) *T. acervulata* (Nyl.) Anzi, Lich. Longob. exs. Nr. 334, *Lecidea acervulata* Nyl. in Bot. Notiser 1853 p. 183, *Thalloidima acervulata* Kbr., Syst. (1855) p. 180, *Biatora acervulata* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 736 (1867). — Arn. Nr. 361.

Tirol (Saut., Zwackh b. Kbr. 1 p. 180).

L Grenzkamm: auf Moos des Obermädelejoches 2015 m (Rehm b. Kph. 4 p. 185; Rehm 1 p. 108).

I Waldrast: sehr selten auf Kalkboden der Felsen auf Trinser Markung (Arn. 4 XI. p. 495, 498); Oberberg: selten über Moosen auf Kalkblöcken nicht weit vom vorderen See (Arn. 4 XIII. p. 270).

K Kleiner Rettenstein: selten auf Erde des Gipfels (Arn. 4 X. p. 104 Nr. 26 als *T. fuscispora*: XI. p. 498).

B Auf Moosen bei Ratzes (Milde 29 p. 19; b. Arn. 4 IV. p. 635).

4. (482.) *T. aromatica* (Turner) Mass., Symm. Lich. (1855) p. 54, *Lichen aromoticus* Turner in Engl. Bot. XXV. (1807) tab. 1777. — Arn. Nr. 945.

M Meran: auf dem Mörtel im Innern des Thurmes der Ruine Brunnenburg, nicht häufig (Arn. 4 XXII. p. 62).

B Jenesien: auf Sandstein am Gipfel des westnordwestlich gelegenen Hügels, gut entwickelt, aber sehr wenig vorhanden (Kst. 4 III. p. 713 mit „2“).

R Am Abhänge ober Torbole auf Kalk (Kst. 4 VII. p. 306); Monte Baldo (Mass. 6 p. 54).

5. (483.) *T. syncomista* (Floerke) Th. Fr., Lich. scand. p. 335 (1874), *Lecidea sabuletorum* β *syncomista* Floerke in Magaz. Ges. naturforsch. Fr. Berlin I. (1803) p. 310, Stizenb. in Nova Acta acad. nat. cur. XXXIV. 2. Nr. 2 (1867) p. 38, *Biatora Regeliana* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 280 (1857), *Bilimbia Regeliana* Kbr., Par. p. 168 (1860). — Arn. Nr. 362.