

Lecidea candida Ach., Meth. (1803) p. 79, Schaer., Enum. (1850) p. 103, *Biatora candida* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 124 (1853). — Arn. Nr. 354.

V Kleines Walsertal: Fellhorn (Kph. 4 p. 184); Brand bei Bludenz (Hesse 1 Bd. 58 p. 507).

L Aggenstein, Thaneller (Britzelm. 3 p. 113).

O Stanzerthal, auf Kalk: Aufstieg zum Kaiserjoch, Schnannerklamm (Arn. 4 XXV. p. 389); Imst: Alpeil auf Erde und in Felsenritzen, Kalk 11. September 1841 (Pkt. b. DT. 10 p. 283, jedoch liegt hierüber kein Beleg vor; vielmehr bezeichnete Arnold eines von den betreffenden Exemplaren als *Th. intermedium*, das andere als fraglich; ein weiteres mit „*Lecidea candida*“ bestimmtes Exemplar: „ad rupes Heiterwand 17. September 1846“ gehört vielleicht zu *Aspicilia calcarea*); an einem Glimmerschieferfelsen gleich ober Gurgl (Arn. 4 XXI. p. 97).

I Innsbruck: Spitzbühel auf humusbedecktem Diluvialconglomerat (Sarnth. Hb. F.); ? Lanserkopf (Pkt. b. DT. 10 p. 283, fehlt jedoch im Hb.); Waldrast: an Kalkfelsen in beiden Gruben (Arn. 4 VI. p. 1127).

U Achensee: auf Kalk (Pichler Hb. F.); Brixlegg: gut ausgebildet an den Felsen des Hügels und ober dem Taxenpeter (Arn. 4 XII. p. 523); Zillertal: am Hainzenberg auf Urkalkschiefer (Ung. 8 p. 249).

K An allen Kalkfelsen des Alpen- und Uebergangskalkes (Ung. 8 p. 249).

M Sulden: an Kalkblöcken bei St. Gertraud sowie beim „Langen Stein“ (Arn. 4 XXII. p. 69, 70).

P Taufers: in Rain auf Schieferblöcken an sonnigen Stellen (Arn. 4 XIX. p. 277); Prags (Wulfen; siehe Arn. 4 XXII. p. 87 Nr. 21); Buchenstein oder Predazzo (Molendo b. Arn. 2 p. 460).

B Gröden: sparsam an einem Kalkfelsen im Langethale in einer dem *Th. diffractum* nahestehenden Form (Arn. 4 XXX. p. 221), Ferraralpe auf Dolomitfelsen (Arn. 4 XXVIII. p. 118); Schlerengebiet: an Dolomit bei Ratzes (Milde 29 p. 19), auf Dolomit bei Salegg, am Heuwege (Arn. 4 IV. p. 642); bei Bozen und bei den Eislöchern (Strasser); Salurn: über Kalk (Kst. 4 VI. p. 213).

? **F** Predazzo: siehe **P**.

G Stenico und Lago di Nembia auf Kalk, steril (Kst. 4 V. p. 326).

R Torhole (Wagner), am alten Wege von Arco nach Nago (Kst. 4 VII. p. 306).

b) **alpinum** Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 131.

I Brenner: selten auf steinigem Boden der Bergschneiden (Arn. 4 XIII. p. 259 Nr. 75, XVI. p. 404, XVII. p. 567), auch an der Südseite im Griesberg (Arn. 4 XVII. p. 567).

4. (489.) **Th. intermedium** Mass. b. Th. Fr., Lich. scand. p. 338 (1874), Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVI. (1876) p. 404. — Arn. Nr. 355.

O Imst: Alpeil auf Erde und in Felsspalten (Pkt. Hb. F. als *Th. candidum*; b. DT. 10 p. 282, 283).

D Tauern: ziemlich selten an Phyllitfelsen in Innerschlöss (Arn. 4 XVIII. p. 267).

F Fassa: am Aufstiege zum Sasso dei Mugoni auf den Blöcken aus Buchensteinerkalk (Arn. 4 XX. p. 362).