

4. (496.) **B.** Beckhansii Kbr., Par. p. 134 (1860), Arn. in Flora LIV. (1871) p. 53, Th. Fr., Lich. scand. p. 359 (1874). — Arn. Nr. 526.

**O** Gurgl: selten an Zweigen von *Rhododendron ferrugineum* auf der Hohen Mut (Arn. 4 XV. p. 378).

**I** Waldrast: selten an Stämmchen der Zwergweiden in der Matreier Grube, selten an den Stämmchen von *Rhododendron ferrugineum* ober der Waldrast, selten an den unteren Zweigen des Abhangs unter den Serleswänden (Arn. 4 VI. p. 1122, 1140, XI. p. 505, 507); Brenner: selten an Zweigen von *Rhododendron ferrugineum* beim Kaserer im Vennathale (Arn. 4 XIII. p. 274).

**K** Kleiner Rettenstein: an der Rinde der Erlenbäume (Arn. 4 XIV. p. 493).

**T** Paganella: über Moosen (Kst. 4 IV. p. 323).

b) *stenospora* (Hepp) Th. Fr., Lich. scand. p. 361 (1874).  
Biatora *stenospora* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 516 (1860).

**F** Paneveggio: auf den Rhizomen von *Sedum roseum* ober dem kleinen Cavallazzo-See, selten (Arn. 4 XXIII. p. 148).

5. (497.) **B.** Friesiana (Hepp) Kbr., Par. p. 133 (1861), Biatora *Friesiana* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 288 (1857). — Arn. Nr. 527.

**I** Seefeld: auf dünnen Fichtenzweigen im Walde an der Strasse gegen Scharnitz: var. .... (Arn. 4 XIV. p. 473).

**B** Jenesien: an den Astnarben von Birken (Kst. 4 V. p. 342).

6. (498.) **B.** albescens (Hepp) Zwackh in Flora XL. (1862) p. 495, Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 580, *Scoliciosporum atro-sanguineum* f. *albescens* Hepp b. Arn. in Flora XLI. (1858) p. 475, *B. phacodes* Kbr., Par. p. 130 (1860). — Arn. Nr. 974.

**L** Plansee: an Buchenstämmen (Arn. 4 XXIX. p. 123, 124).

**O** Arlberg: Anschüttungsdamm gegenüber St. Anton, auf „schiefer-arligem Glimmer“ beim Waldsaume (Arn. 4 XXV. p. 365), dasselbst auch auf veralteten Ziegenkoth übergesiedelt angetroffen (Arn. 4 XXV. p. 365, 401), Verwallthal, auf einem alternden *Polyporus* (Arn. 4 XXIX. p. 136, 142).

**F** Predazzo: auf einem alten Knochen im Syenitgerölle am Fusse der Margola; Paneveggio: auf Holzmoder im Innern eines alten Fichtenstrunkes im Walde gegen Rolle (Lojka b. Arn. 4 XXIII. p. 143, 149).

7. (499.) **B.** inundata (Fr.) Kbr., Syst. (1855) p. 187, Biatora *inundata* Fr. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. (1822) p. 270, *Bacidia Arnoldiana*  $\beta$  *inundata* Kbr., Par. p. 135 (1860). Siehe Arn. in Flora LIV. (1871) p. 54, LXVII. (1884) p. 579. — Arn. Nr. 528\*).

**O** Kühetai: an einem verwilteten Unterkiefer im Felsengerölle zwischen den Finsterthaler Seen (Arn. 4 XIV. p. 450); Umhausen: an oft überspülten Blöcken am linken Bachufer beim Wasserfalle nicht häufig (Arn. 4 VII. p. 285).

\*) Arn. Nr. 529 ist *Mycobacidia herbarum* (Hepp) Rehm — Rbh.-Rehm Nr. 4814 — siehe Bd. III.