

I Rosskogel: dürlig entwickelt an Steinen im Bache bei den Lakln (Arn. 4 III. p. 952, XVII. p. 556); Brenner: hie und da an grösseren Steinen in den Gletscherbächen (Arn. 4 XIII. p. 248), gut ausgebildet an öfter überschwemmten Blöcken am Rande eines Baches im Hintergrunde des Vennathales (Arn. 4 XIV. p. 494).

K Kleiner Rettenstein: sparsam an Phyllitfelsen des Gipfelmassivs (Arn. 4 X. p. 96).

F Nicht häufig auf grösseren Porphyristeinen in den Alpenbächen des Travignologebietes (Arn. 4 XXIII. p. 117).

S. (500.) **B. endoleuca** (Nyl.) Kickx, Fl. crypt. Flandres (1867) p. 261, Biatora luteola f. endoleuca Nyl. in Bot. Notiser 1853 p. 98, Biatora atrogrisea Hepp, Flecht. Eur. Nr. 26 (1853), vix Delise b. Kbr., Par. p. 133 (1860), Lecidea endoleuca Nyl. in Acta soc. sc. fenn. VII. (1863) p. 478. — Arn. Nr. 530.

I Innsbruck: an Fichten- und Tannenrinde bei Höttling (Schuler b. Beck & Zahlbr. 1^a Nr. 258, 1^b XII. p. 92).

B An Fichtenrinde im Walde unterhalb Ratzen (Arn. 4 IV. p. 624 Nr. 53, 54 als B. arceutina [Ach.] und B. atrogrisea: XXI. p. 139); Ueberetsch: selten an den Rhododendronzweigen bei den Eislöchern, f. (Arn. 4 X. p. 116 Nr. 11: XXI. p. 139).

9. (501.) **B. arceutina** (Ach.) Arn. in Flora LIV. (1871) p. 53, Th. Fr., Lich. scand. p. 352 (1874), Lecidea luteola γ arceutina Ach., Meth. (1803) p. 61, ? Lichen effusus Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 173. Siehe Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 580.

B Jenesien: Remp auf Pinus abies (Kst. 4 III. p. 721); Ratzen: siehe B. endoleuca.

10. (502.) **B. acerina** (Pers.) Arn. in Flora XLV. (1862) p. 391, Th. Fr., Lich. scand. p. 346 (1874), Lecidea luteola β acerina Pers. in Ach., Meth. (1803) p. 61, Secoliga acerina Stizenb. in Nova Acta acad. nat. cur. XXX. (1863) p. 60. — Arn. Nr. 531.

B Sarnthal: an Fichten bei der Moltnerkaser (Kst. 4 VI. p. 209); Jenesien: auf Fichten, Lärchen, Tannen (Kst. 4 III. p. 721, 724, V. p. 340); nicht selten an Fichten im Walde unterhalb Ratzen (Arn. 4 IV. p. 624, Exs. Nr. 346); Ueberetsch: auf Tannen beim Montiggler-See (Kst. 4 II. p. 346).

F Predazzo: auf Tannen im Walde am Wege zur Alpe Val Maor (Arn. 4 XXI. p. 108); Paneveggio: an einer feuchten Waldstelle an jüngeren Fichten (Arn. 4 XX. p. 371, XXI. p. 110; Zwackh 1 Nr. 532).

11. (503.) **B. rubella** (Ehrh.) Mass., Ric. (1852) p. 118, Kbr., Syst. (1855) p. 186, Par. p. 131 (1860), Lichen rubellus Ehrh., Pl. crypt. exs. Nr. 196 (1785), Verrucaria rubella Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1895) p. 174, Biatora rubella Rbh., Deutschl. Crypt. Fl. II. 1. (1845) p. 94, Lichen luteolus Schrad., Spiel. fl. germ. (1794) p. 85, Lecidea luteola Ach., Meth. (1803) p. 60, Biatora luteola Fr. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 1822 p. 272. — Arn. Nr. 975.

B Sarnthal: auf morschem Holze eines alten Birnbaumes bei Sarnthein (Hsm. b. Arn. 4 XXII. p. 75); Jenesien: auf Ulmus häufig,