

9. (520.) **B. lignaria** (Ach.) Th. Fr., Lich. scand. p. 382 (1874).  
*Lecidea lignaria* Ach., Lich. univ. (1810) p. 169, *B. milliaria*  $\alpha$  *lignaria* Th. Fr., I. c. p. 382, *B. milliaria* Fr. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 1822 p. 255 und Lich. eur. (1831) p. 342 p. p., Kbr., Syst. (1855) p. 214, *Lecidea sabuletorum* var. *milliaria* Stizenb. in Nova Acta acad. nat. cur. XXXIV. P. 2. Nr. 2 (1867) p. 44. Siehe Arn. in Flora XLV. (1862) p. 391, LXVII. (1884) p. 572. — Arn. Nr. 517.

**P** Ehrenburg: auf Erdboden am Getzenberge: Simmer und im Thale gegen Ilstern (Kst. 4 VII. p. 291).

**B** Schlern: auf einem faulen Lärchenstamme im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernkamm (Arn. 4 IV. p. 624, Exs. Nr. 348a); Ueberetsch: auf bemoosten Blöcken der Eislöcher, selten, *Hypnum cupressiforme* incrustierend (Arn. 4 X. p. 114).

**F** Ueber veralteter *Peltigera canina* auf einem bemoosten Porphyrfelsen im Walde bei Paneveggio von Lojka beobachtet, ober dem Cavallazzo-See bei 2500 m auf Rhodiola-Rhizomen, sparsam (Arn. 4 XXIII. p. 108, 148).

Var. .... Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 139.

**O** Kühentai: selten zwischen *Gymnomitrium* mit *Lecanora rhypariza* an der Gneisswand links vom Finsterthaler See (Arn. 4 XIV. p. 457); Gurgl: sparsam über *Gymnomitrium* längs der Felsspalten auf der Hohen Mut (Arn. 4 XV. p. 374).

10. (521.) **B. trisepta** (Naeg.) Th. Fr., Lich. scand. p. 382 (1874).  
*Biatora trisepta* Naeg. b. Müller-Arg. in Mém. soc. phys. Genève XVI. (1862) p. 403 (nomen solum), *Lecidea sabuletorum* f. *trisepta* Stizenb. in Nova Acta acad. nat. cur. XXXIV. P. 2. Nr. 2 (1867) p. 47, *B. millaria* Kbr., Par. p. 170 (1860), *B. millaria*  $\beta$  *trisepta* Th. Fr., I. c. p. 382. Siehe Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 572. — Arn. Nr. 518.

**L** Plansee: an Ahorn, Weiden und an dünnen abgedornten Zweigen von *Taxus baccata* (Arn. 4 XXIX. p. 124, 128).

**I** Innsbruck: Lanserköpfe an Tannen (Wagner).

**P** Ehrenburg: über Moosen auf dem Kienberge (Kst. 4 VII. p. 288).

**B** Jenesien: auf *Rhododendron ferrugineum* am Krummenbühel (Kst. 4 V. p. 345).

**F** Fassa: Campitello auf Kalkhumus (Wagner); Predazzo: selten an den Stämmchen von *Rhododendron ferrugineum* im Syenitgerölle am Fusse der Margola (Arn. 4 XX. p. 360); Paneveggio: selten an der Rinde jüngerer Fichten unterhalb des Ortes (Arn. 4 XXI. p. 110); im Porphyrgerölle ebendorf über veralteten Moosen, auf Holzmoder im Porphyrgerölle ober dem Travignolo zwischen Paneveggio und Bellamonte, über *Sphagnum acutifolium* im feuchten Porphyrgerölle ober dem Travignolo eine Strecke unterhalb Paneveggio (Arn. 4 XXIII. p. 108, 142, 149).

b) ***ternaria*** (Nyl.) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 381, *Lecidea sabuletorum* var. *ternaria* Nyl. in Notiser soc. fauna et fl. fenn. VIII. (1866) 1882 p. 151, *L. ternaria* Nyl. in Flora LX. (1877) p. 232. *B. millaria*  $\beta$  *saxicola* Kbr., Par. p. 171 (1860). *B. trisepta* f. *saxicola* Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 573 und Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 101.