

17. (528.) **B. caesiomarginata** Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLIV. (1894) p. 216.

B Eggenthal: über Moosen an Kalkblöcken im Walde am Karrer-See (Kst. 4 VI. p. 216).

18. (529.) **B. ? incrassata** (Hedlund) Zahlbr. in litt., *Micarea incrassata* Hedlund in Bihang Svenska Vetensk.-Akad. Handl. XVIII. (1892) Afd. III. Nr. 3 p. 94.

I, E Brenner: über Moosen (A. Minks in bot. Mus. Upsala b. Hedlund l. c.).

Bilimbia Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLII. (1892) p. 335.

B Jenesien: auf Sandstein im Walde rechts vom Wege auf den Salten (Kst. 4 V. p. 335 Nr. 50).

73. *Lopadium* Kbr.

1. (530.) **L. pezizoideum** (Ach.) Kbr., Syst. (1855) p. 210, Par. p. 175 (1860), *Lecidea pezizoidea* Ach., Lich. univ. (1810) p. 182, *Heterothecium pezizoideum* β disciforme Fw. in Bot. Zeitg. VIII. (1850) p. 553. — Arn. Nr. 535.

L Plansee: an Fichten, speciell an der Strasse nach Ammerwald (Arn. 4 XXIX. p. 126, 129, Exs. Nr. 765^c).

F Predazzo: hie und da an einer alten Tanne im Walde gegen Val Maor (Arn. 4 XXI. p. 108); Paneveggio: an der Rinde einiger jüngerer Fichten an einer feuchten Waldstelle neben dem Fahrwege gegen Giuribell (Arn. 4 XX. p. 371, Exs. Nr. 765^a), an Fichten im feuchten Walde gegen Bellamonte (Arn. 4 XXI. p. 109, 110, Exs. Nr. 765^b).

b) **musciolum** (Smft.) Th. Fr., Lich. scand. p. 389 (1874) *Lecidea muscicola* Smft. in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. (1823) p. 113, *Lopadium pezizoideum* β *musciolum* Th. Fr., l. c. p. 389.

O Mittelberg: auf steinigem Boden beim Steinmannl nicht weit vom Mittagkögele (Arn. 4 XVII. p. 542, Exs. Nr. 636); Kùhetai: ziemlich selten über veralteten Moosen auf steinigem Boden des Abhanges ober dem Plendele-See (Arn. 4 XIV. p. 459); Gurgl: gut ausgebildet auf Erde der Hohen Mut, auch am Wege zum Ramoljoch bei 2700 m (Arn. 4 XV. p. 374).

2. (531.) **L. sociale** Hepp b. Kbr., Par. p. 174 (1860), Mass. in Atti Istit. veneto 1853 p. 266, *Biatora socialis* Hepp in litt. ad Kbr. (1859); siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIII. (1873) p. 104, *L. fecundum* Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 302, Lich. scand. p. 391 (1874). — Arn. Nr. 536.

L Grenzkamm: Schwarze Milz auf Moos 2015 m (Rehm 1 p. 113).

O Gurgl: selten über Moospolstern an felsigen Stellen an der Nordseite der Hohen Mut (Arn. 4 XX. p. 382).

I Brenner: ziemlich selten über veralteten Moosen auf steinigem Boden der Bergschneiden (Arn. 4 XIII. p. 263).

K Kleiner Rettenstein: selten auf Erde des Gipfels (Arn. 4 X. p. 104).

D Tauern: Rottenkogel auf Erdboden oder Moosen nicht häufig (Arn. 4 XVIII. p. 257).