

— **S. decipiens** Mass., Sched. crit. (1855) p. 177, *Acarospora simplex* h. decipiens Jatta, Syll. (1900) p. 225.

R Monte Baldo: an Oolithfelsen (Jatta l. c.).

4. (542.) **S. pruinosa** (Sm.) Kbr., Syst. (1855) p. 267, Par. p. 235 (1861), *Lichen pruinosis* Sm., Engl. Bot. XXXII. tab. 2244 (1811), *Myriospora pruinosa* Hepp, Flecht. Eur. Nr. 143 (1853), *Biatorella* (*Sarcogyne*) *pruinosa* Mudd, Man. Brit. Lich. (1861) p. 191. — Arn. Nr. 539.

U Zillerthal: Gerlossteinwand auf krystallinischem Kalk 2162 m (Arn. 4 XXIV. p. 259).

M Meran: auf Glimmerschieferfelsen bei der Villa Maurer [Martinsbrunn] in Gratsch (Milde 30 p. 11).

P Ehrenburg: auf Thonschiefer selten (Kst. 4 VII. p. 284).

B Jenesiën: auf Sandstein und Kalk (Kst. 4 III. p. 715, 716); Schlern: an Dolomitblöcken bei Salegg (Arn. 4 IV. p. 647); Bozen: auf krystallinischem Kalk bei Rafenstein (Kst. 4 II. p. 346); Eppan: auf Mergeln im Buchenwalde vor Perdonig (Kst. 4 II. p. 346); Montan bei Neumarkt auf Porphy; Salurn auf Kalk (Kst. 4 VI. p. 211, 213).

F Predazzo: auf den Seiser- und Campiller-Schichten an der Westseite der Margola (Arn. 4 XXIII. p. 118).

T Andalo: auf Kalk (Kst. 4 V. p. 327); Monte Gazza und Paganella auf Kalk (Kst. 4 IV. p. 321); Buco di Vela bei Trient, auf Kalk (Kst. 4 V. p. 327); Vezzano, auf Kalk (Strasser).

R Schloss Arco, Nago, auf Kalk (Kst. 4 VII. p. 306); Rovereto: Villa Lagarina auf Kalkconglomerat (Strasser).

5. (543.) **S. pusilla** Anzi in Comm. soc. critt. ital. I. Nr. 3 (1862) p. 157, *Biatorella pusilla* Zahlbr. in Ann. naturhist. Hofmus. IV. (1889) p. 355, *Acarospora pusilla* Nyl. b. Jatta, Syll. (1900) p. 226. — Arn. Nr. 540.

I Waldrast: nicht besonders selten an Kalkfelsen in beiden Gruben, auf Trinser Markung: Exs. Nr. 465, auf Gerölle unter den Serleswänden (Arn. 4 VI. p. 1130, XI. p. 493), nicht häufig an den Felsplatten von Kalkglimmerschiefer oberhalb Trinser Markung (Arn. 4 XIV. p. 477).

P Ampezzo: am Gipfel des Dürrenstein 2836 m (Arn. 4 XVI. p. 400).

B Schlern: an rotem Raiblerdolomit ober dem Heubade, nur kärglich ausgebildet: Exs. Nr. 361, gute Exemplare nicht selten an den Kalkblöcken in der Umgebung des Heubades (Arn. 4 IV. p. 647).

F Paneveggio: Monte Viënsa auf Kalk, 2400 m (Arn. 4 XXIII. p. 131), Monte Castellazzo auf Kalk, nicht häufig (Arn. 4 XX. p. 377, XXIII. p. 134), auf mergeligem Kalk am Rollepasse gegen den Cimon (Arn. 4 XXIII. p. 127).

T „In regione Tridentina“ (Jatta 1 p. 226); Monte Gazza: auf Kalk bei der Malga di Covelo (Kst. 4 IV. p. 321).

6. (544.) **S. urceolata** Anzi in Comm. soc. critt. ital. I. (1862) p. 157. — Arn. Nr. 977.

O Stanzertal: Almejurjoch 2224 m, auf Kalk (Arn. 4 XXV. p. 390), auf Mergelkalk der Partnachsichten bei der Augsburgershütte (Arn. 4 XXVI. p. 102).