

77. Psora Hoffm.

1. (545.) *P. ostreata* Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 163, Kbr., Par. p. 118 (1862), *Lecidea ostreata* Schaer., Spicil. III. (1829) p. 110, *Parmelia ostreata* Fr., Lich. eur. (1831) p. 94. — Arn. Nr. 363.

O Kùhetai: steril auf verkohltem Holze alter Bäume am Eingange des Längenthales, c. ap. gut ausgebildet an dem von der Rinde entblößten Holze einer alten Zirbe im Längenthale (Arn. 4 XIV. p. 468).

I Waldrast: steril hie und da am Grunde der gegenüber befindlichen Lärchenstämme an trockener, rissiger Rinde, nur einmal c. ap. beobachtet (Arn. 4 XI. p. 514).

U Brandenberg: an der Rinde einer alten Lärche, steril (Arn. 4 XXX. p. 211).

P Im Pusterthale sehr verbreitet (Kst. b. Kern. 78^b VIII. p. 92); Ehrenburg: an Lärchenstrünken c. ap. auf dem Kienberge und steril auf einem Bretterzaune beim Bahnhofe, auf Lärchenrinde am Kienberg und häufig auf dem Pfälzener Plateau (Kst. 4 VII. p. 292, 296; b. Kern. 78^a Nr. 3127, 78^b VIII. p. 92); Schluderbach: c. ap. ziemlich selten an hartem und verkohltem Holze alter Föhren- und Lärchenstrünke (Arn. 4 XVI. p. 413).

D Steril auf morschen Lärchenstrünken im Walde oberhalb Windischmatri (Arn. 4 XVIII. p. 250).

B Gröden: auf morschen Lärchenstumpfen am Wege von Plan zur Ferraraalpe, steril (Arn. 4 XXVIII. p. 118).

2. (546.) *P. lurida* (Sw.) Kbr., Syst. (1855) p. 176, Par. p. 118 (1860), *Lichen luridus* Sw. in Nova Acta soc. sc. Upsal. IV. (1784) p. 247, *Lecidea lurida* Ach., Meth. (1803) p. 77, *Biafara lurida* Fr., Lich. eur. (1831) p. 253, Stenhammar, Sched. crit. (1833) p. 9. — Arn. Nr. 364.

L Am Aggensteinweg bei Vils (Britzelm. 3 p. 114).

I Innsbruck: Frauhitt auf Erde (Hfl. b. DT. 10 p. 281; das betreffende Exemplar kann nach Arn. auch *Placidium hepaticum* sein), Sillufer bei der Reichenau (Leithe 2 p. 42), Lanserkopf auf Kalk (Pkt. b. DT. 10 p. 281, Hb. F.; Sarnth, Hb. F.); Stubai: zwischen Telfes und Unterberg (Sarnth.); Waldrast: auf steinigem Boden der Matreier Grube (Arn. 4 VI. p. 1120, XI. p. 498).

U Brixlegg: an den Kalkfelsen des Hügels (Arn. 4 XII. p. 523).

K In Felsenritzen der Salve, selten (Ung. 8 p. 247).

M Sulden: an Kalkblöcken bei St. Gertraud (Arn. 4 XXII. p. 69).

P Stolla-Alpe in Prags (Hsm. Hb. F.).

N Rocchetta am Eingange des Nonstales (Hfl. b. DT. 10 p. 281, Hb. F.).

B Gröden: Ferraraalpe auf Dolomit (Arn. 4 XXVIII. p. 118); Schlerngebiet: Schlern (Funck b. Sturm 1^b Heft 28/29 p. 98), an Dolomit bei Ratzes (Milde 29 p. 19; b. Arn. 4 IV. p. 642), auf Erde mit *Distichium capillaceum* zwischen Dolomitblöcken unweit der Zallinger Schwaig, an Dolomittfelsen bei Salegg, längs des Heuweges, an den grossen Verrucano-Kalkblöcken am Fretschbache oberhalb Ratzes (Arn. 4 IV. p. 635, 642); Bozen: auf Erde zwischen Porphyrfelsen nicht gerade selten, steril an Felswänden ober Gries (Arn. 4 X. p. 112), Runkelstein (Kst. 4 II. p. 344), am Calvarienberg (Giovannelli