

- P** Schluderbach: auf Erdboden (Arn. 4 XVI. p. 402).
- D** Tauernthal: auf Erde von Kalkblöcken (Arn. 4 XVIII. p. 260).
- B** Gröden: im Jahre 1851 von Giovanelli gesammelt (Hfl. 49 p. 258), auf Erdboden bei der Ladiniahütte (Arn. 4 XXX. p. 222), Sellajoch: am Fusse der Fünffingerspitze (Arn. 4 XXVIII. p. 113); Schlern (Hsm. 1864 Hb. F.), auf dem Gipfel des Schlern (Hsm. b. Hfl. 49 p. 258), auf Dolomit am Schlernplateau (Milde 29 p. 19), auf steinigem Kalkboden an vielen Stellen des Schlern bis zum Heubade (Arn. 4 IV. p. 635); Rosengarten (Reisach b. Hfl. 49 p. 258); um Bozen (Hsm. b. Kbr. 3 p. 119); „da es sich hier um die Identität nicht handeln kann, ich dieser Flechte aber nirgends ansichtig werden konnte, so muss ich annehmen, dass dieselbe im Gebiete fast oder ganz ausgerottet ist“ (Kst. 2 p. 21: die Stelle bei Körber bezieht sich jedoch offenbar auf das Vorkommen am Schlern); Mendelweg an der Ostseite, wo er die Höhe erreicht (Hfl. 49 p. 258); Auer: Castell Feder auf Porphyry c. ap. (Kst. 4 VI. p. 212).
- F** Paneveggio: auf Kalkerboden gegen Vineghie, auf Erdboden im Bereiche der Seiser- und Campiller-Schichten am Rollepasse (Arn. 4 XXIII. p. 137, 126), Monte Castellazzo (Hfl. b. DT. 10 p. 280, Hb. F.).
- T** Molveno: auf Erde c. ap. (Kst. 4 V. p. 328); Vezzano (Strasser).
- R** Marocche bei Dró (Kst. 4 VII. p. 309); Riva: Ponale auf Erde, ziemlich selten (Arn. 4 IX. p. 309), Doss Brione (Strasser), Nago (Arn. 4 XXIX. p. 130), am alten Wege von Arco nach Nago, am Abhänge ober Torbole (Kst. 4 VII. p. 309).
7. (551.) **P. atrobrunea** (Ram.) Mass., Ric. (1852) p. 92, Rhizocarpon atrobrunneum Ram. b. Lam. et DC., Fl. franç. 3. éd. II. (1805) p. 367, Lecidea atrobrunnea Schaer., Spicil. III. (1829) p. 134, Lecidella atrobrunnea Kbr., Syst. (1855) p. 239, Par. p. 198 (1861), Lichen dispermus Vill., Hist. pl. Dauph. III. (1789) p. 994 nach Kph., Gesch. u. Litt. Lich. II. (1869) p. 538. — Arn. Nr. 367.
- O** Paznaun: auf Glimmerschieferfelsen in der Nähe und in gleicher Höhe mit der Jamthalerhütte (Arn. 4 XXVII. p. 109); Kühetai: selten an den Felsen zwischen den Finsterthaler Seen (Arn. 4 XIV. p. 441); Gurgl: an Gneisswänden am Wege zum Eisse, sparsam auf Hornblendeschiefer rechts ober dem Gaisberggletscher (Arn. 4 XV. p. 358, 365).
- I** Sellrain: Längenthaler Ferner an Felsen; Innsbruck: Neunerspitze an Schieferfelsen (Pkt. b. DT. 10 p. 282).
- U** Zillertal: Felsblöcke an der linken Seite des Schwarzenstein-Sees (Arn. 4 XXIV. p. 258).
- K** An Thonschieferfelsen bei Taxen in Jochberg, sehr selten (Ung. 8 p. 248; Saut. 21 p. 414, Hb. F.); Grosser Rettenstein: auf Phyllit, nicht häufig (Arn. 4 V. p. 530, XIV. p. 475); Kleiner Rettenstein; Geisstein (Zwackh).
- B** Sarnthal: nördliches Kreuzjoch auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 197); Gröden: auf Porphyry am Raschötz (Arn. 4 XXX. p. 220); Schlern: auf Spilit im Damers (Arn. 4 IV. p. 618 Nr. 22 als Lecidea fumosa: V. p. 546).
- F** Fassa: Monzoni auf rothbraunem Diorit (Arn. 4 XX. p. 367); Paneveggio: nicht häufig an Porphyrböcken ober der Waldregion, auf den Höhen westlich vom Colbriccon (Arn. 4 XXIII. p. 112).
- G** Pinzolo: Mandron auf Tonalit (Kst. 4 I. p. 334).