Rhododendronstämmchen, auf Salix retusa bei den feuchten Wänden gegen die Finsterthaler Seen (Arn. 4 XIV. p. 462, 461); Gurgl: selten an dünnen Rhododendron ferrugineum-Zweigen gegenüber der Ortschaft (Arn. 4 XV. p. 378).

I Waldrast: selten an dünnen Lärchenzweigen oberhalb derselben (Arn. 4 VI. p. 1138, XI. p. 515), ebendort selten an Zweigen der beiden Rhododendren (Arn. 4 VI. p. 1139 Nr. 12 am Schlusse), auf den Stämmchen und Zweigen von Salix retusa in der Matreier Grube, nicht selten an den Zweigen von Sorbus chamaemespilus (Arn. 4 X. p. 504 Nr. 6[b], p. 506).

K Grosser Rettenstein: an Zweigen von Rhododendron ferrugineum (Arn. 4 V. p. 544 Nr. 6 var.: XIV. p. 475); Kleiner Rettenstein: auf Rhododendron ferrugineum nicht selten (Arn. 4 X. p. 107), auf Alnus incana im Walde ober Pass Thurn (Arn. 4 XIV. p. 492).

M Meran: Kirchsteigeralpe im Sinnichthale auf Rhododendron ferrugineum (Kst. 4 VI. p. 206).

P Ehrenburg: auf Birkenrinde (Kst. 4 VII. p. 296).

D Tauern: an Rhododendron ferrugineum unweit des Schlatenkees (Arn. 4 XVIII. p. 262).

B Sarnthal: auf Rhododendron ferrugineum im Walde bei der Möltnerkaser (Kst. 4 VI. p. 206); Gröden: an dünnen Fichtenzweigen in einer Waldschlucht des Confinbodens zwischen Unterkofel und der Langkofelhütte (Arn. 1 Nr. 1764).

T Monte Gazza: an Rhododendron hirsutum und Salix glabra bei der Malga di Covelo, Paganella, an Dryas (Kst. 4 IV. p. 324).

6. (563.) **B. fallax** Hepp b. Arn. in Flora XLI. (1858) p. 482 und LXVII. (1884) p. 430, Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 375, Exs. Nr. 505 (1860), B. vernalis f. fallax Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXX. (1880) p. 132, ? B. conglomerata Kbr., Syst. (1855) p. 204, Par. p. 154 (1860). Vergl. Verrucaria conglomerata (Heyd.) Hoffm. Deutschl. Fl. II. (1795) p. 174.

K Kleiner Rettenstein: an Fichten im Walde ober Pass Thurn, ziemlich selten (Arn. 4 XIV. p. 491).

P Ampezzo: ziemlich selten an Fichtenrinde zwischen Schluderbach und Ospedale (Arn. 4 XVI. p. 408).

B Auf der Rinde von Pinus mugus beim Ansteigen zum Schlern, bei etwa 2270 m (Milde 29 p. 19), an Pinus mugus am Schlernabhange ober der Seiseralpe (Milde b. Arn. 4 IV. p. 625); Bozen: an einem entrindeten Baumstrunke mit Lecanora varia c) apochroea (Kst. 2 p. 22 als B. conglomerata Kbr.); Eggenthal: an Tannen im Karrerwald (Kst. 4 VI. p. 217).

F Paneveggio: auf Fichtenrinde an einer feuchten Waldstelle am Fahrwege gegen Giuribell (Arn. 4 XX. p. 371).

7. (564.) **B. helvola** Kbr. b. Hellbom in Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 1867 p. 271, Th. F., Lich. scand. p. 429 (1874). — Arn. Nr. 376.

I An Alnus incana in den Innauen bei Inzing (Arn. 4 XVII. p. 560).

8. (565.) **B. meiocarpa** (Nyl.) Arn. in Flora XLVII. (1884) p. 430, Lecidea meiocarpa Nyl. in Sched. 1863, in Flora LIX. (1876) p. 577, L. anomala γ minuta Schaer., Spicil. IV./V. (1833) p. 170 nach Arn.