

XI. p. 515), Blaser, nicht selten an Legföhrenzweigen (Arn. 4 XI. p. 509, Exs. Nr. 499^a); Obernberg: nicht selten an Lärchenzweigen bei den Seen (Arn. 4 XIII. p. 277); Brenner: auf Rhododendron ferrugineum nicht gar selten, sowohl im Vennathale als in der Nähe der Kraxenträger Alpenhütte (Arn. 4 XIII. p. 274), an Lärchenrinde im Walde des Griesberghales mit Lecanora subintricata (Arn. 4 XVII. p. 570, Exs. Nr. 499^b).

K Kleiner Rettenstein: nicht häufig an dickeren Zweigen von Rhododendron ferrugineum (Arn. 4 X. p. 107).

E Plose: auf Pinus cembra (Kst. 6 p. 304).

P Ampezzo: an jüngeren Lärchen (Arn. 4 XVI. p. 406).

D Tauern: auf Rhododendron am Rande des Schlattenkees (Arn. 4 XVIII. p. 262).

B Sarnthal: nördliche Kaserböden an Rhododendron ferrugineum und Pinus mugus (Kst. 4 VI. p. 206, 207).

18. (575.) **B. obscurella** (Smft.) Th. Fr., Lich. scand. p. 467 (1874), Lecidea obscurella Smft., Pl. crypt. Norveg. exs. Nr. 132 (1826), L. pellucida γ obscurella Smft., Suppl. fl. lapp. (1826) p. 161 p. p., L. (Biatora) obscurella Th. Fr., l. c. p. 467, B. phaeostigma Kbr., Syst. (1855) p. 199, Par. p. 157 (1860). — Arn. Nr. 384.

I Brenner: ziemlich selten an Lärchenrinde im Walde des Griesberghales mit Lecanora subintricata (Arn. 4 XVII. p. 570).

B Salten bei Jenesien, auf Larix (Kst. 4 V. p. 341).

G Pinzolo: auf modernden Kastanienstrünken (Kst. 4 I. p. 331).

19. (576.) **B. Cadubriae** (Mass.), Kbr., Par. p. 157 (1860), Krempelhuberia Cadubriae Mass., Geneac. Lich. (1854) p. 15, nonen solum, Sched. crit. X. (1855) p. 176, Lecidea (Biatora) Cadubriae Nyl. in Notiser Sällsk. fauna et fl. fenn. Förh. XIII. (1871—1874) p. 335. — Arn. Nr. 385.

I Waldrast: nicht häufig an Lärchenrinde im Walde unter den Serleswänden: Exs. Nr. 594^b, ebendort auch selten auf altem Holze der Lärchenstrünke am Waldsaume (Arn. 4 XI. p. 514 Nr. 49, p. 518 Nr. 25, XIV. p. 482, XVII. p. 566); Brenner: an der Rinde älterer Lärchen im Griesberg (Arn. 4 XIII. p. 277 Nr. 26: XXI. p. 132).

U Brandenberg: an der Rinde einer alten Lärche (Arn. 4 XXX. p. 211).

[**P** Ampezzo: an der rissigen Rinde einer alten Lärche unweit vom Misurina-See (Arn. 4 XVI. p. 406, Exs. Nr. 594^a), extra fines.]

B Sarnthal: an Lärchen im Walde längs des Weges von der Moltnerkaser zum Kreuzjoch (Kst. 4 VI. p. 208).

b) **heterella** (Nyl.) Th. Fr., Lich. scand. p. 468 (1874), Lecidea heterella Nyl. in Notiser soc. fauna et fl. fenn. Förh. VIII. (1866) 1882 p. 147, in Flora LVIII. (1873) p. 299, non L. Cadubriae var. heterella Nyl. in Notiser Sällsk. fauna et fl. fenn. Förh. XIII. (1871—1874) p. 335.

I Waldrast: hie und da an Lärchenrinde im Walde unter den Serleswänden (Arn. 4 XI. p. 515: XXI. p. 132).

Var. Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVII. (1877) p. 570.