

**I** Rosskogel: an grösseren Blöcken der Gerölle längs des Weissbaches bis zu den Bergschneiden, doch nicht häufig (Arn. 4 XVII. p. 551 Nr. 37: XXI. p. 133); Brenner: nicht selten an Felsen und niedrigen Wänden in der Nähe vom Wilden See (Arn. 4 XIII. p. 237), Vennathal, auf Quarz (Arn. 4 XVII. p. 568).

**U** Zillerthal: Grünberg, am Gehänge ober den Hütten (Arn. 4 XXIV. p. 255); Geisstein: auf der Unterseite von Thonschieferfelsen (Saut. 17 p. 43; 21 p. 412; siehe Schaer. 1 p. 111).

**M** Meran: Vöranerjoch auf Porphyry (Kst. 4 VI. p. 197).

**B** Sarnthal: nördliches Kreuzjoch, Kaserböden auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 197); Jenesiën: auf Porphyry (Kst. 4 III. p. 707); Gröden: auf Porphyry bei Innerpontifes: f. . . . . (Arn. 4 XXVIII. p. 121).

**F** Fassa: Monzoni, auf krystallinischem, mit Silikaten imprägniertem Kalk (Arn. 4 XX. p. 367); Predazzo: hie und da auf Turmalingranitblöcken am Mulatto (Arn. 4 XX. p. 354), auf Syenit am Fusse der Margola, selten (Arn. 4 XXIII. p. 84); Paneveggio, Porphyry: an einer Felsgruppe ober dem Colbriccone-See: Exs. Nr. 797, an Felsen von Rolle bis zum Cavallazzo (Arn. 4 XXI. p. 103).

43. (600.) **B. mollis** (Wahlenb.) Th. Fr. in Nova Acta soc. sc. Upsala III. (1860) p. 298, Lich. scand. p. 451 (1874), Kst. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XL. (1890) p. 319\*, *Lecidea rivulosa*  $\beta$  *mollis* Wahlenb., Fl. lapp. (1812) p. 472, *L. mollis* Nyl., Lich. Scand. (1860) p. 223.

**E** Grasstein: auf Granit; Brixen: am Wege zum Walderhof, auf Schiefer (Sarnth. b. Kst. 6 p. 304, Hb. F.).

**B** Jenesiën: auf Porphyry (Kst. 4 V. p. 338).

**G** Pinzolo: auf Tonalit bei S. Stefano, auf Thonschiefer (Kst. 4 I. p. 319, 323).

44. (601.) **B. lygaea** (Ach.) Arn. in Flora LIV. (1871) p. 485, *Lecidea lygaea* Ach., Syn. (1814) p. 34, *B. rivulosa* 3) *lygaea* Arn. l. c. p. 485, *B. lygaea* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVII. (1897) p. 218. — Arn. Nr. 956\*\*).

**E** An Granit bei Mittenwald im Juli 1863 von Metzler gesammelt „Nr. 225“ (Arn. 4 XXX. p. 217).

**B** Gröden: auf Porphyry bei Wolkenstein (Arn. 4 XXX. p. 218, 219), an der Strasse gegen St. Ulrich (Arn. 1 Nr. 1706<sup>a</sup>), in einem Felsen-gerölle zwischen St. Ulrich und St. Peter (Arn. 1 Nr. 1706<sup>b</sup>); Ueberetsch: an beschatteten Porphyrfelsen der Eislöcher (Arn. 4 VIII. p. 297 Nr. 62 als *B. rivulosa* var., XXI. p. 133 als *B. Kochiana*: XXX. p. 215).

45. (602.) **B. instrata** (Nyl.) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXIX. (1879) p. 372, XLIII. (1893) p. 374, *Lecidea instrata* Nyl. in Flora LX. (1877) p. 224, Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVI. (1896) p. 102. — Arn. Nr. 402.

\*) Ueber eine briefliche Anfrage, ob auch die hier folgenden Stellen gleich *B. mollis* Arn. zu *B. Kochiana* zu ziehen wären, erhielten wir von Kernstock eine verneinende Auskunft.

\*\*) Th. Fr., Lich. scand. p. 452 und Zahlbr. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVIII. (1898) p. 357 stellen *B. Kochiana* hieher als Synonym.