

- O** Stanzerthal: Malfonthal zerstreut zwischen anderen Arten auf Glimmerschieferblöcken (Arn. 4 XXV. p. 374), auf Glimmerschieferblöcken unweit der Angsbürgerhütte bei Pians 2320 m (Arn. 4 XXVI. p. 102).
- F** Paneveggio: an Quarzporphyrblöcken längs einer trockenen Wasserrinne ober dem Rollepasse (Arn. 4 XX. p. 372, Exs. Nr. 756).
46. (603.) **B. leucophaea** Floerke b. Kbr., Syst. (1855) p. 194. **B. leucophaea** α *genuina* Kbr., Syst. (1855) p. 195, Par. p. 148 (1860). **Lecidea leucophaea** Nyl. in Flora LIII. (1870) p. 35. **B. pannaecola** Fr. in Svenska Vetensk.-Åkad. Handl. 1822 p. 269 p. p., **B. viridiatra** Fr., Lich. eur. (1831) p. 277; siehe Kbr., Par. p. 148 (1860). — Arn. Nr. 403.
- O** Arlberg: auf einem Glimmerschieferfelsen im äusseren Verwallthale (Arn. 4 XXV. p. 378).
- K** Kleiner Rettenstein: **B. pannaecola** und **B. viridiatra** (Saut. 17 p. 43), nicht häufig an den Phyllitwänden am Wege zum Rossgrubkogel (Arn. 4 XIV. p. 486); Geisstein (Zwackh).
47. (604.) **B. disjecta** (Nyl.) Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 84, **Lecidea disjecta** Nyl. in Flora LXIV. (1881) p. 184. — Arn. Nr. 957.
- F** Predazzo: auf Syenit am Fusse der Margola ziemlich selten (Arn. 4 XXIII. p. 84); zerstreut an grösseren Porphyrböcken im Walde unterhalb Paneveggio (Arn. 4 XXI. p. 102 Nr. 17 als **Lecanora** . . . : XXIII. p. 99), auf Porphyrböcken an waldigen Stellen der Berge um Paneveggio: a) am Fusswege gegen Giuribell; Zwackh 1 Nr. 668 A. B., b) am Waldsaume zwischen Paneveggio und der Alpe Vineghie: Lojka 1 Nr. 82 (Arn. 4 XXIII. p. 99).
48. (605.) **B. Berengeriana** Mass., Ric. (1852) p. 128. — Arn. Nr. 404.
- V** Kleines Walsertal: Fellhorn (Kph. 4 p. 215).
- L** Grenzkamm: Obermädelejoch (Rehm b. Kph. 4 p. 215; siehe Rehm 1 p. 111).
- O** Stanzerthal: Almejurjoch 2224 m, Kalkerboden (Arn. 4 XXV. p. 391); Gurgl: ziemlich selten auf felsigem Boden der Hohen Mut (Arn. 4 XV. p. 373).
- I** Waldrast: nicht selten auf feuchter Erde in beiden Gruben (Arn. 4 VI. p. 1120, Exs. Nr. 439), auf Kalksteingerölle am Aufstiege zu den Serleswänden, auch Moose: **Tortella tortuosa** inkrustierend (Arn. 4 XI. p. 498); Brenner: nicht häufig, doch gut ausgebildet auf steinigem Boden der Bergschneiden (Arn. 4 XIII. p. 260), am Wege im Vennathale auf einer aus krystallinischem Kalk und Gneiss zusammengesetzten Felsmasse (Arn. 4 XIV. p. 495).
- U** Zillerthal: Gerlosstein auf Erdboden (Arn. 4 XXIV. p. 260).
- K** Grosser Rettenstein: sehr sparsam auf Erde des Gipfels, Dolomit (Arn. 4 V. p. 534).
- E** Lügen: unter dem Joche gegen Afers auf Moosen über Dolomit (Sarnth. b. Kst. 6 p. 304, Hb. F.).
- D** Tauern: Rottenkogel auf Erdboden (Arn. 4 XVIII. p. 256).
- B** Sarnthal: nördliches Kreuzjoch über Moosen (Kst. 4 VI. p. 205); Jenesien: auf Porphyrboden am Wege nach Afing (Kst. 4 V.