

an den Felswänden hinausragenden Platten: Exs. Nr. 1004; Lojka b. Kern. 78^a Nr. 1548, 78^b IV. p. 100; var. . . . ziemlich selten an den Wänden des südlichen Absturzes (Arn. 4 XXIII. p. 121).

7. (623.) *L. formosa* Baglietto et Carestia in Comm. soc. critt. ital. II. Nr. 1 (1864) p. 82. — Arn. Nr. 415.

I Brenner: selten an Geröllsteinen unter einem Felsen nicht weit vom Wilden See (Arn. 4 XIII. p. 232, 233).

8. (624.) *L. lacticolor* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. (1878) p. 283. — Arn. Nr. 416.

O Paznaun: Jamthal, an den am Gehänge etwas weiter aufwärts, ungefähr in gleicher Höhe mit der Hütte befindlichen Glimmerschieferfelsen mit den einsamen Zirben (Arn. 4 XXVII. p. 109); Mittelberg: auf Gneiss und Glimmerschiefer (Arn. 4 XVII. p. 535 Nr. 39: XXI. p. 134); Kühetai: an den Felsen der Bergschneide links ober dem Finsterthaler See bei 2600 m (Arn. 4 XIV. p. 442 Nr. 56, XIX. p. 283, 286), an der Unterfläche der Felsen längs der Bergschneiden östlich ober dem Plendele-See, auch ober dem mittleren Finsterthaler Gletscher (Arn. 4 XIX. p. 283); Gurgl: an Glimmerschieferfelsen der Schneide rechts ober dem Gaisberggletscher (Arn. 4 XV. p. 358 Nr. 53 als *Lecidella formosa* var.: XIX. p. 286), im Glimmerschiefergerölle an der Westseite der Hohen Mut, theils an der Unterfläche der Blöcke und theils an den grösseren unter den Felsblöcken liegenden Steinen, die dem Schatten und der Feuchtigkeit mehr ausgesetzt sind (Arn. 4 XIX. p. 286, Exs. Nr. 715).

F Predazzo: auf dem Gipfel des Monte Paradiso ziemlich selten an der Unterfläche einzelner Porphyrfelsen (Arn. 4 XXI. p. 103); Paneveggi: selten auf Porphyrböcken an der Westseite des Castellazzo (Arn. 4 XXIII. p. 113).

9. (625.) *L. tessellata* Floerke, Deutsche Lich. Nr. 64 (1821), ?*Verrucaria tessellata*-Hoffm., Deutschl. Fl. II. (1795) p. 185, *Lecidella spilota* Kbr., Syst. (1855) p. 207, Par. p. 267 (1861), non *Lecidea pantosticta* γ *spilota* Ach., Syn. (1814) p. 13, ?*L. spilota* Fr., Lich. eur. (1831) p. 297, ?*L. lapicida* β *cyanea* Ach., Meth. (1803) p. 38, ?*L. cyanea* Th. Fr., Lich. scand. p. 489 (1874). Siehe Arn. in Flora LXVII. (1884) p. 553. — Arn. Nr. 417.

V Kleines Walsertal: Fellhorn (Gümbel b. Kph. 4 p. 194).

O Stanzerthal: auf Glimmerschieferblöcken des Abhanges bei der Arlbergstrasse oberhalb St. Anton (Arn. 4 XXIX. p. 137), auf Schiefergestein zwischen Strengen und Pians (Arn. 4 XXV. p. 361); Pitzthal: auf Hornblendeschieferfelsen am Wege bei St. Leonhard (Arn. 4 XXIV. p. 262); Silz: an Phyllitfelsen (Arn. 4 XXII. p. 77); Gurgl: nicht häufig, doch in gut ausgebildeten Exemplaren im gegenüberliegenden Gerölle (Arn. 4 XIX. p. 286).

I Waldrast: ziemlich selten an Kalkglimmerschieferblöcken oberhalb Trinser Markung (Arn. 4 XVII. p. 564).

K Kleiner Rettenstein (Saut. nach Hfl. 51): an den Phyllitwänden am Wege zum Rossgrubkogel (Arn. 4 XIV. p. 487).

E Brixen: bei Seeburg auf Schiefer, in Lüssen auf Porphyry (Sarnth. b. Kst. 6 p. 304, Hb. F.).

P Ehrenburg: wenig entwickelt auf Thonschiefer der Steinmauer am Marbacher Sattel, auf Quarzit am Getzenberge (Kst. 4 VII. p. 283).