

286); Taufers: an den Glimmerschieferblöcken der Strassenmauer bei Sand (Arn. 4 XIX. p. 273); Buchenstein oder Predazzo (Molendo h. Arn. 2 p. 461).

D Tauern: auf Chloritschiefer bei Proseck 1060 m (Arn. 4 XVIII. p. 253).

B Jenesien: auf Porphyry und Sandstein (Kst. 4 III. p. 707, 714, V. p. 335, 338, VI. p. 219); Gröden: auf Augitporphyry bei Plan gegen das Sellajoch (Arn. 4 XXVIII. p. 119); Schlerengebiet, Augitporphyry: a) an Blöcken im Walde unterhalb Ratzes, b) an sonnigen Blöcken des Trümmergerölles bei Seis (Arn. 4 IV. p. 614); Ueberetsch: nicht häufig an Blöcken der Eislöcher (Arn. 4 VIII. p. 298).

F Fassa: am Aufstiege von Vigo zum Sasso dei Mugoni auf Buchensteinerkalk, Monzonithal auf Augitporphyry (Arn. 4 XX. p. 362, 365); Predazzo: siehe **P**, auf Syenit am Fusse der Margola (Arn. 4 XX. p. 357, 358, XXIII. p. 85) und auf der Höhe derselben (Arn. 4 XXIII. p. 91); Paneveggio: auf Porphyryfelsen am Travnolo gegen Bellamonte (Arn. 4 XXIII. p. 99), auf Syenitbänken an der Westseite des Monte Castellazzo (Arn. 4 XX. p. 375).

G Pinzolo: auf Tonalit bei S. Stefano, auf Thonschiefer (Kst. 4 I. p. 319, 323).

b) *cerustacea* Nyl. b. Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. (1878) p. 294.

O Vent: am Gipfel der Kreuzspitze 3450 m, sparsam (Arn. 4 XIX. p. 294).

B Sarnthal: südliches Kreuzjoch auf Sandstein (Kst. 4 VI. p. 197 mit „?“).

c) *caesia* Anzi, Catal. Lich. sondr. (1860) p. 80; siehe Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVII. (1887) p. 121, *L. injuncta* Nyl. in Flora LXIV. (1881) p. 4.

O Stanzerthal: Kaiserjoch auf einem kalkarmen Gestein 2318 m (Arn. 4 XXV. p. 369, 370), auf mergeligem Kalk der Partnachschichten bei der Augsburgerhütte (Arn. 4 XXVI. p. 102).

F Fassa: auf Sandstein der Seiser- und Campiller-Schichten am Westabhange der Rodella (Neugschwentner b. Arn. 1 Nr. 1005^b); Predazzo: auf Augitporphyrybreccie links ober dem Satteljöchl bei 2200 m (Arn. 4 XXIII. p. 118); Paneveggio: auf Augitporphyrybreccie der Gipfelhöhe des Monte Viésena (Arn. 4 XXIV. p. 264), Sandstein und Mergelkalk am Rollepasse, auf grösseren Steinen an einem Abhange gegen den Cimon (Arn. 4 XXIII. p. 121, Exs. Nr. 1005).

d) *ochracea* Arn. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XXVIII. (1878) p. 268 als „var. quaedam ochracea“, XXIX. (1879) p. 358.

D Tauern: selten an Glimmerschieferblöcken unweit Aussergschlöss (Arn. 4 XVIII. p. 268 Nr. 16: XX. p. 358).

e) *pericarpoides* Nyl. in Flora LXIV. (1881) p. 539, *L. polycarpoides* Nyl. ibid. LVIII. (1875) p. 105, non *Biatora polycarpoides* Müll.-Argov. in Flora LIII. (1870) p. 259.

F Predazzo: auf Syenit am Fusse der Margola, hie und da (Arn. 4 XX. p. 358 Nr. 20 als *L. tessellata* var. *ochracea*: XXIII. p. 85).